

অধ্যায় ১৩: সসীম ধারা

প্রশ্ন ▶ ১ $2 + 4 + 8 + 16 + \dots$ ধারাটির প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি 1022 এবং একটি সমান্তর ধারার 10 তম পদ 34 এবং 16 তম পদ 52.

[ঢাকা বোর্ড-২০১৯ ৷ প্রশ্ন নং ৩]

- ক. $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots + 11^2$ ধারাটির সমষ্টি নির্ণয় কর। ২
 খ. n এর মান নির্ণয় কর। 8
 গ. সমান্তর ধারাটির প্রথম 20টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। 8

১ নং প্রশ্নের সমাধান

ক আমরা জানি,

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\text{সুতরাং } 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots + 11^2 = \frac{11(11+1)(22+1)}{6}$$

$$= \frac{11 \times 12 \times 23}{6}$$

$$= 506 \text{ (Ans.)}$$

খ প্রদত্ত ধারাটি, $2 + 4 + 8 + 16 + \dots$

যার প্রথম পদ, $a = 2$

$$\text{এবং সাধারণ অনুপাত, } r = \frac{4}{2} = \frac{8}{4} = 2 > 1$$

\therefore এটি একটি গুণোত্তর ধারা।

আমরা জানি, গুণোত্তর ধারার প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি,

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}; r > 1$$

\therefore প্রদত্ত গুণোত্তর ধারাটির প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি,

$$S_n = \frac{2(2^n - 1)}{2 - 1} = 2(2^n - 1)$$

প্রশ্নমতে, $2(2^n - 1) = 1022$

$$\text{বা, } 2^n - 1 = 511$$

$$\text{বা, } 2^n = 512$$

$$\text{বা, } 2^n = 2^9$$

$$\therefore n = 9 \text{ (Ans.)}$$

গ মনে করি, সমান্তর ধারার প্রথম পদ a এবং সাধারণ অন্তর d

$$\text{সুতরাং } 10\text{-তম পদ } a + (10 - 1)d = a + 9d$$

$$\text{এবং } 16\text{-তম পদ } = a + (16 - 1)d = a + 15d$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } a + 9d = 34 \dots \dots (i)$$

$$a + 15d = 52 \dots \dots (ii)$$

(ii) - (i) করে পাই,

$$a + 15d - a - 9d = 52 - 34$$

$$\text{বা, } 6d = 18 \therefore d = 3$$

d এর মান (i) নং এ বসিয়ে পাই,

$$a + 9 \times 3 = 34$$

$$\text{বা, } a = 34 - 27$$

$$\therefore a = 7$$

এখন ধারাটির প্রথম 20টি পদের সমষ্টি

$$= \frac{20}{2} \{2a + (20 - 1)d\}$$

$$= 10\{2 \times 7 + 19 \times 3\}$$

$$= 10(14 + 57)$$

$$= 10 \times 71$$

$$= 710 \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন ▶ ২ একটি গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ $\frac{1}{2}$ এবং 7 তম পদ $\frac{1}{128}$ । কোনো সমান্তর

ধারার প্রথম 5টি পদের সমষ্টি 35 এবং প্রথম 10টি পদের সমষ্টি 120। [রাজশাহী বোর্ড-২০১৯ ৷ প্রশ্ন নং ৩]

ক. $\log 3 + \log 9 + \log 27 + \log 81 + \dots$ ধারাটির সাধারণ অন্তর নির্ণয় কর। ২

খ. গুণোত্তর ধারাটির প্রথম 7টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। 8

গ. সমান্তর ধারাটির 20 তম পদ নির্ণয় কর। 8

২ নং প্রশ্নের সমাধান

ক $\log 3 + \log 9 + \log 27 + \log 81 + \dots$
 $= \log 3 + \log 3^2 + \log 3^3 + \log 3^4 + \dots$
 $= \log 3 + 2 \log 3 + 3 \log 3 + 4 \log 3 + \dots$
 ধারাটির সাধারণ অন্তর, $d = 2 \log 3 - \log 3$
 $= \log 3 \text{ (Ans.)}$

খ মনে করি, গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ, $a = \frac{1}{2}$

এবং সাধারণ অনুপাত $= r$

$$\text{ধারাটির } 7 \text{ তম পদ } = ar^{7-1} = \frac{1}{2} \cdot r^6$$

$$\text{শর্তমতে, } \frac{1}{2} r^6 = \frac{1}{128}$$

$$\text{বা, } r^6 = \frac{1}{64}$$

$$\text{বা, } r^6 = \left(\frac{1}{2}\right)^6$$

$$\therefore r = \frac{1}{2} < 1$$

সুতরাং গুণোত্তর ধারাটির প্রথম 7টি পদের সমষ্টি

$$= \frac{a(1 - r^7)}{1 - r}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^7 \right\}}{1 - \frac{1}{2}}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2^7} \right)}{\frac{1}{2}}$$

$$= 1 - \frac{1}{128}$$

$$= \frac{127}{128} \text{ (Ans.)}$$

গ মনে করি, সমান্তর ধারার প্রথম পদ $= a$

সাধারণ অন্তর $= d$

$$\text{সুতরাং প্রথম 5টি পদের সমষ্টি } = \frac{5}{2} \{2a + (5 - 1)d\}$$

$$\text{এবং প্রথম 10টি পদের সমষ্টি } = \frac{10}{2} \{2a + (10 - 1)d\}$$

$$1\text{ম শর্তমতে, } \frac{5}{2} (2a + 4d) = 35$$

$$\text{বা, } 2a + 4d = 14 \dots \dots (i)$$

$$2\text{য় শর্তমতে, } 5 (2a + 9d) = 120$$

$$\text{বা, } 2a + 9d = 24 \dots \dots (ii)$$

(ii) নং থেকে (i) বিয়োগ করে পাই,

$$5d = 10 \therefore d = 2$$

(i) নং এ $d = 2$ বসিয়ে পাই,

$$2a + 4 \times 2 = 14$$

$$\text{বা, } 2a = 14 - 8$$

$$\text{বা, } a = \frac{6}{2} \therefore a = 3$$

সুতরাং ধারাটির 20 তম পদ $= a + (20 - 1)d$

$$= 3 + 19 \times 2$$

$$= 3 + 38$$

$$= 41 \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন ▶ ৩ একটি সমান্তর ধারার 15-তম পদ 89 এবং 21-তম পদ 125 এবং অপর

একটি গুণোত্তর ধারা $-\frac{1}{2} + x + y + z - 2 + \dots$

[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৯ ৷ প্রশ্ন নং ৩]

- ক. $7 + 11 + 15 + \dots$ ধারাটির 210 তম পদ নির্ণয় কর। ২
 খ. উদ্দীপকের সমান্তর ধারাটির প্রথম 25টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। 8
 গ. উদ্দীপকের গুণোত্তর ধারাটির x, y ও z এর মান নির্ণয় কর। 8

৩ নং প্রশ্নের সমাধান

ক $7 + 11 + 15 + \dots$ ইহা একটি সমান্তর ধারা।
 যার 1ম পদ, $a = 7$
 সাধারণ অন্তর, $d = 11 - 7 = 4$
 আমরা জানি,
 সমান্তর ধারার n তম পদ $= a + (n - 1)d$
 \therefore প্রদত্ত ধারার 210 তম পদ $= a + (210 - 1)d$
 $= 7 + 209 \times 4$
 $= 7 + 836$
 $= 843$ (Ans.)

খ দেওয়া আছে,
 একটি সমান্তর ধারার 15 তম পদ $= 89$ এবং 21 তম পদ $= 125$
 মনে করি, ধারাটির 1ম পদ $= a$
 সাধারণ অন্তর $= d$
 আমরা জানি,
 সমান্তর ধারার n তম পদ $= a + (n - 1)d$
 \therefore প্রদত্ত ধারার 15 তম পদ $= a + (15 - 1)d$
 $= a + 14d$
 এবং 21 তম পদ $= a + (21 - 1)d$
 $= a + 20d$

শর্তানুসারে,
 $a + 14d = 89 \dots \dots$ (i)
 এবং $a + 20d = 125 \dots \dots$ (ii)
 (ii) নং হতে (i) নং বিয়োগ করে পাই,
 $a + 20d - a - 14d = 125 - 89$
 $6d = 36$
 $\therefore d = 6$
 (i) নং এ d এর মান বসিয়ে পাই,
 $a + 14 \times 6 = 89$
 $a + 84 = 89$
 $a = 89 - 84$
 $a = 5$

আবার, সমান্তর ধারার n পদের সমষ্টি,
 $S_n = \frac{n}{2} \{2a + (n - 1)d\}$
 \therefore ধারাটির 25টি পদের সমষ্টি,
 $S_{25} = \frac{25}{2} \{2a + (25 - 1)d\}$
 $= \frac{25}{2} (2a + 24d)$
 $= \frac{25}{2} \times 2(a + 12d)$
 $= 25 (5 + 12 \times 6)$
 $= 25 \times 77$
 $= 1925$ (Ans.)

গ দেওয়া আছে,
 গুণোত্তর ধারাটি, $-\frac{1}{2} + x + y + z - 2 + \dots$
 এখানে, ধারাটির 1ম পদ, $a = -\frac{1}{2}$
 মনে করি, ধারাটির সাধারণ অনুপাত $= r$
 আমরা জানি,
 গুণোত্তর ধারার n তম পদ $= ar^{n-1}$
 \therefore ধারাটির 5ম পদ $= ar^{5-1} = ar^4$
 $\therefore ar^4 = -2$
 বা, $-\frac{1}{2} r^4 = -2$
 বা, $r^4 = 4$

বা, $r^4 = (\sqrt{2})^4$
 $\therefore r = \sqrt{2}$
 \therefore ধারাটির 2য় পদ, $x = ar^{2-1} = ar = -\frac{1}{2} \times \sqrt{2} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$

3য় পদ, $y = ar^{3-1}$
 $= ar^2$
 $= -\frac{1}{2} (\sqrt{2})^2$
 $= -\frac{1}{2} \times 2$
 $= -1$

8র্থ পদ, $z = ar^{4-1}$
 $= ar^3$
 $= -\frac{1}{2} \times (\sqrt{2})^3$
 $= -\frac{1}{2} \times 2\sqrt{2}$
 $= -\sqrt{2}$
 $\therefore x = -\frac{1}{\sqrt{2}}, y = -1, z = -\sqrt{2}$ (Ans.)

প্রশ্ন 8 কোনো গুণোত্তর ধারার 8র্থ পদ $\frac{\sqrt{2}}{3}$ এবং 9ম পদ $\frac{4}{9\sqrt{3}}$ ।

[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৯ 11 প্রশ্ন নং ২]

- ক. $125 + 25 + 5 + \dots$ ধারার কোন পদ $\frac{1}{125}$ তা নির্ণয় কর। ২
 খ. ধারাটি নির্ণয় কর। 8
 গ. দেখাও যে, ধারাটির প্রথম 6টি পদের সমষ্টি $\frac{19}{18} (\sqrt{3} + \sqrt{2})$ । 8

8 নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত ধারা, $125 + 25 + 5 + \dots$
 এখানে, প্রথম পদ, $a = 125$
 এবং সাধারণ অনুপাত, $r = \frac{25}{125} = \frac{1}{5}$
 আমরা জানি, গুণোত্তর ধারার n তম পদ $= ar^{n-1}$
 প্রশ্নমতে, $ar^{n-1} = \frac{1}{125}$
 বা, $125 \times \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1} = \frac{1}{125}$
 বা, $\left(\frac{1}{5}\right)^{n-1} = \frac{1}{125 \times 125}$
 বা, $\left(\frac{1}{5}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{5}\right)^6$
 বা, $n - 1 = 6$
 বা, $n = 6 + 1$
 $\therefore n = 7$
 \therefore ধারাটির 7ম পদ $\frac{1}{125}$ (Ans.)

খ মনে করি, গুণোত্তর ধারাটির 1ম পদ, a
 সাধারণ অনুপাত, r
 আমরা জানি, গুণোত্তর ধারার n তম পদ $= ar^{n-1}$
 \therefore ধারাটির চতুর্থ পদ $= ar^{4-1} = ar^3$
 এবং ,, 9ম ,, $= ar^{9-1} = ar^8$
 প্রশ্নমতে, $ar^3 = \frac{\sqrt{2}}{3} \dots \dots$ (i)
 এবং $ar^8 = \frac{4}{9\sqrt{3}} \dots \dots$ (ii)
 (ii) নং কে (i) নং দ্বারা ভাগ করে পাই,
 $\frac{ar^8}{ar^3} = \frac{\frac{4}{9\sqrt{3}}}{\frac{\sqrt{2}}{3}}$
 বা, $r^5 = \frac{4}{9\sqrt{3}} \times \frac{3}{\sqrt{2}}$

$$\text{বা, } r^3 = \frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } r^3 = \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^3$$

$$\therefore r = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

(i) নং এ r এর মান বসিয়ে পাই,

$$a \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^3 = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$\text{বা, } a \times \frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$\text{বা, } a = \frac{\sqrt{2}}{3} \times \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$$

$$\therefore a = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

\(\therefore\) নির্ণেয় ধারাটি = $a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^2 + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^3 + \dots$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{2}}{3} + \dots \text{ (Ans.)}$$

গ 'খ' হতে পাই,

$$\text{ধারাটির ১ম পদ, } a = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{এবং সাধারণ অনুপাত, } r = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} < 1$$

$$\therefore \text{ ধারাটির প্রথম ৬টি পদের সমষ্টি} = \frac{a(1-r^6)}{1-r}$$

$$= \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} \left\{ 1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^6 \right\}}{1 - \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}}$$

$$= \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} \left(1 - \frac{8}{27}\right)}{\frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{3}}}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{27-8}{27}\right) \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$$

$$= \frac{19\sqrt{3}}{54} \times \frac{\sqrt{3}(\sqrt{3}+\sqrt{2})}{(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})} \text{ [লব ও হরকে } (\sqrt{3}+\sqrt{2}) \text{ দ্বারা গুণ}$$

করে]

$$= \frac{19(\sqrt{3}+\sqrt{2})}{18 \cdot 3-2}$$

$$= \frac{19}{18}(\sqrt{3}+\sqrt{2})$$

$$\therefore \text{ ধারাটির ১ম ৬টি পদের সমষ্টি } \frac{19}{18}(\sqrt{3}+\sqrt{2}) \text{ (দেখানো হলো)}$$

প্রশ্ন ৫ একটি গুণোত্তর ধারার ৪র্থ পদ $\frac{1}{3}$ এবং দশম পদ $\frac{1}{81}$ এবং অপর সমান্তর ধারার ১ম ১২ পদের সমষ্টি ২২২ এবং ১ম ২৪ পদের সমষ্টি ৪৭৬।

[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৯ ৷ প্রশ্ন নং ৩]

ক. $3+5+7+9+\dots$ ধারার কোন পদ ৩০৩? ২

খ. গুণোত্তর ধারাটি নির্ণয় কর। ৪

গ. সমান্তর ধারাটির ৬০ তম পদ নির্ণয় কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত সমান্তর ধারাটির,

$$\text{১ম পদ, } a = 3$$

$$\text{সাধারণ অন্তর, } d = 5 - 3 = 2$$

$$\text{মনে করি, ধারাটির } n \text{ তম পদ} = 303$$

$$\text{আমরা জানি, } n\text{-তম পদ} = a + (n-1)d$$

$$\therefore a + (n-1)d = 303$$

$$\text{বা, } 3 + (n-1)2 = 303$$

$$\text{বা, } 3 + 2n - 2 = 303$$

$$\text{বা, } 2n + 1 = 303$$

$$\text{বা, } 2n = 302$$

$$\text{বা, } n = 151$$

\(\therefore\) প্রদত্ত ধারার ১৫১ তম পদ ৩০৩ (Ans.)

খ মনে করি, গুণোত্তর ধারাটির

$$\text{১ম পদ} = a$$

$$\text{সাধারণ অনুপাত} = r$$

$$\text{আমরা জানি, গুণোত্তর ধারার } n \text{ তম পদ} = ar^{n-1}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } ar^{4-1} = \frac{1}{3}$$

$$\text{বা, } ar^3 = \frac{1}{3} \dots \dots \dots (i)$$

$$\text{এবং } ar^{10-1} = \frac{1}{81}$$

$$\text{বা, } ar^9 = \frac{1}{81} \dots \dots \dots (ii)$$

(ii) নং কে (i) নং দ্বারা ভাগ করে পাই,

$$\frac{ar^9}{ar^3} = \frac{\frac{1}{81}}{\frac{1}{3}}$$

$$\text{বা, } r^6 = \frac{3}{81}$$

$$\text{বা, } r^6 = \frac{1}{27}$$

$$\text{বা, } r^6 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^6$$

$$\text{বা, } r = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore \text{ ধারাটির সাধারণ অনুপাত, } r = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

(i) নং সমীকরণে $r = \frac{1}{\sqrt{3}}$ বসিয়ে পাই,

$$a \times \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^3 = \frac{1}{3}$$

$$\text{বা, } a \frac{1}{3\sqrt{3}} = \frac{1}{3}$$

$$\text{বা, } a = \sqrt{3}$$

$$\therefore \text{ ধারাটির ১ম পদ, } a = \sqrt{3}$$

তাহলে, প্রদত্ত ধারাটি = $a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots$

$$= \sqrt{3} + \sqrt{3} \times \frac{1}{\sqrt{3}} + \sqrt{3} \times \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + \sqrt{3} \times \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^3 + \dots$$

$$= \sqrt{3} + 1 + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3} + \dots \dots \dots \text{ (Ans.)}$$

গ মনে করি, সমান্তর ধারাটির ১ম পদ = a

$$\text{এবং সাধারণ অন্তর} = d$$

আমরা জানি, সমান্তর ধারার ১ম n সংখ্যক পদের সমষ্টি,

$$S_n = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \frac{12}{2} \{2a + (12-1)d\} = 222$$

$$\text{বা, } 6(2a + 11d) = 222$$

$$\text{বা, } 2a + 11d = 37 \dots \dots \dots (i)$$

$$\text{এবং } \frac{24}{2} \{2a + (24-1)d\} = 876$$

$$\text{বা, } 12(2a + 23d) = 876$$

$$\text{বা, } 2a + 23d = 73 \dots \dots \dots (ii)$$

(ii) নং হতে (i) নং বিয়োগ করে পাই,

$$23d - 11d = 73 - 37$$

$$\text{বা, } 12d = 36$$

$$\text{বা, } d = 3$$

\(\therefore\) সমান্তর ধারাটির সাধারণ অন্তর, $d = 3$

$d = 3$, (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$2a + 11 \times 3 = 37$$

$$\text{বা, } 2a = 37 - 33$$

$$\text{বা, } 2a = 4$$

$$\text{বা, } a = 2$$

সুতরাং ধারাটির ১ম পদ, $a = 2$

আমরা জানি, সমান্তর ধারার n তম পদ = a + (n - 1)d

$$\begin{aligned} \therefore \text{ধারাটির 60 তম পদ} &= a + (60 - 1)d \\ &= 2 + 59 \times 3 \\ &= 179 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

প্রশ্ন ▶ ৬ ১ম ধারা : $\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 + \dots$

২য় ধারা : $4 + 7 + 10 + \dots$

◀সম্বন্ধিত অধ্যায় ৫ ও ১৩

[সিলেট বোর্ড-২০১৯ ৷ প্রশ্ন নং ৩]

- ক. $x(x - a) = (x - a)$ সমীকরণের সমাধান সেট নির্ণয় কর। ২
 খ. ১ম ধারার প্রথম দশ পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪
 গ. ২য় ধারাটির প্রথম n পদের সমষ্টি 714 হলে, n এর মান নির্ণয় কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত সমীকরণ, $x(x - a) = x - a$

বা, $x(x - a) - (x - a) = 0$

বা, $(x - a)(x - 1) = 0$

$\therefore x - a = 0$

অথবা, $x - 1 = 0$

বা, $x = a$

বা, $x = 1$

\therefore নির্ণেয় সমাধান সেট, $S = \{1, a\}$ (Ans.)

খ এখানে ১ম ধারার, ১ম পদ $a = \frac{1}{2}$

সাধারণ অনুপাত $r = \frac{1}{\sqrt{2}} \div \frac{1}{2} = \sqrt{2}$

$$\begin{aligned} \therefore \text{১ম দশ পদের সমষ্টি} &= \frac{a(r^{10} - 1)}{r - 1} \\ &= \frac{\frac{1}{2}((\sqrt{2})^{10} - 1)}{\sqrt{2} - 1} \\ &= \frac{32 - 1}{2(\sqrt{2} - 1)} \\ &= \frac{31}{2(\sqrt{2} - 1)} \\ &= \frac{31(\sqrt{2} + 1)}{2(\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1)} \\ &= \frac{31(\sqrt{2} + 1)}{2(2 - 1)} \\ &= \frac{31}{2}(\sqrt{2} + 1) \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

গ ২য় ধারার,

১ম পদ $a = 4$

সাধারণ অন্তর $d = 7 - 4 = 3$

প্রশ্নমতে, ধারাটির ১ম n পদের সমষ্টি = 714

বা, $\frac{n}{2} \{2a + (n - 1)d\} = 714$

বা, $\frac{n}{2} \{2 \cdot 4 + (n - 1) \cdot 3\} = 714$

বা, $n(8 + 3n - 3) = 1428$

বা, $5n + 3n^2 = 1428$

বা, $3n^2 + 5n - 1428 = 0$

বা, $3n^2 + 68n - 63n - 1428 = 0$

বা, $n(3n + 68) - 21(3n + 68) = 0$

বা, $(3n + 68)(n - 21) = 0$

$\therefore n - 21 = 0$ [$3n + 68 \neq 0$]

$\therefore n = 21$ (Ans.)

প্রশ্ন ▶ ৭ (i) $7 + p + q + s + 16807 + \dots$ একটি গুণোত্তর ধারা।

(ii) $7 + 12 + 17 + 22 + \dots$ [বরিশাল বোর্ড-২০১৯ ৷ প্রশ্ন নং ৩]

ক. প্রথম 50টি স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয় কর। ২

খ. p, q, s এর মান নির্ণয় কর। ৪

গ. (ii) নং ধারাটির প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি 1090 হলে, n এর মান নির্ণয় কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের সমাধান

ক আমরা জানি,

প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি = $\frac{n(n + 1)}{2}$

$$\begin{aligned} \therefore \text{প্রথম 50টি স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি} &= \frac{50(50 + 1)}{2} \\ &= 25 \times 51 \\ &= 1275 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

খ প্রদত্ত গুণোত্তর ধারা, $7 + p + q + s + 16807 + \dots$

ধারাটির ১ম পদ, $a = 7$

সাধারণ অনুপাত r হলে,

২য় পদ, $p = ar$

৩য় পদ, $q = ar^2$

৪র্থ পদ, $s = ar^3$

৫ম পদ, $16807 = ar^4$

বা, $16807 = 7 \cdot r^4$

বা, $r^4 = \frac{16807}{7}$

বা, $r^4 = 2401$

বা, $r^4 = (\pm 7)^4$

$\therefore r = \pm 7$

যখন, $r = 7$

$p = 7 \cdot 7 = 49$

$q = 7 \cdot 7^2 = 343$

$s = 7 \cdot 7^3 = 2401$

আবার, যখন, $r = -7$

$p = 7 \cdot (-7) = -49$

$q = 7 \cdot (-7)^2 = 343$

$s = 7 \cdot (-7)^3 = -2401$ (Ans.)

গ প্রদত্ত ধারাটি,

$7 + 12 + 17 + 22 + \dots$

ইহা একটি সমান্তর ধারা,

যার ১ম পদ, $a = 7$

সাধারণ অন্তর, $d = 12 - 7 = 5$

আমরা জানি, সমান্তর ধারার প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি = $\frac{n}{2} \{2a + (n - 1)d\}$

$$\begin{aligned} \therefore \text{প্রদত্ত ধারার n পদের সমষ্টি} &= \frac{n}{2} \{2 \cdot 7 + (n - 1) \cdot 5\} \\ &= \frac{n}{2} (14 + 5n - 5) \\ &= \frac{n}{2} (9 + 5n) \end{aligned}$$

শর্তানুসারে, $\frac{n}{2} (9 + 5n) = 1090$

বা, $9n + 5n^2 = 2180$

বা, $5n^2 + 9n - 2180 = 0$

বা, $5n^2 + 109n - 100n - 2180 = 0$

বা, $n(5n + 109) - 20(5n + 109) = 0$

বা, $(5n + 109)(n - 20) = 0$

হয়, $5n + 109 = 0$ অথবা, $n - 20 = 0$

বা, $5n = -109$ বা, $n = 20$

বা, $n = \frac{-109}{5}$

গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, পদসংখ্যা ঋণাত্মক বা ভগ্নাংশ হয় না।

$\therefore n = 20$ (Ans.)

প্রশ্ন ▶ ৮ $3 + 6 + 9 + 12 + \dots$ [সকল বোর্ড-২০১৮ ৷ প্রশ্ন নং ৩]

ক. প্রথম 20টি স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয় কর। ২

খ. ধারার n সংখ্যক পদের সমষ্টি 630 হলে n এর মান নির্ণয় কর। ৪

গ. ধারার ১ম পদকে ১ম পদ এবং সাধারণ অন্তরকে সাধারণ অনুপাত ধরে একটি গুণোত্তর ধারা তৈরি কর এবং ধারাটির ১ম 10টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের সমাধান

ক আমরা জানি, প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি, $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$

$$\therefore \text{প্রথম } 20 \text{ টি স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি, } S_{20} = \frac{20(20+1)}{2}$$

$$= \frac{20 \times 21}{2} = 210 \text{ (Ans.)}$$

খ প্রদত্ত ধারাটি $3 + 6 + 9 + 12 + \dots$

এটি একটি অসীম সমান্তর ধারা যার, প্রথম পদ, $a = 3$

সাধারণ অন্তর, $d = 6 - 3 = 3$

আমরা জানি, সমান্তর ধারার প্রথম n -সংখ্যক পদের

$$\text{সমষ্টি, } S_n = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\} = 630$$

$$\text{বা, } \frac{n}{2} \{2 \times 3 + (n-1)3\} = 630$$

$$\text{বা, } \frac{n}{2} (6 + 3n - 3) = 630$$

$$\text{বা, } \frac{3n}{2} (n+1) = 630$$

$$\text{বা, } n^2 + n = 420$$

$$\text{বা, } n^2 + n - 420 = 0$$

$$\text{বা, } n^2 + 21n - 20n - 420 = 0$$

$$\text{বা, } n(n+21) - 20(n+21) = 0$$

$$\text{বা, } (n+21)(n-20) = 0$$

$$\text{বা, } n-20 = 0 \quad [n+21 \neq 0, \text{ কারণ পদসংখ্যা ঋণাত্মক হতে পারে না}]$$

$$\therefore n = 20 \text{ (Ans.)}$$

গ 'খ' হতে পাই, সমান্তর ধারার ১ম পদ, $a = 3$, সাধারণ অন্তর $d = 3$

প্রশ্নমতে, গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ, $a = 3$

সাধারণ অনুপাত, $r = 3 > 1$

গুণোত্তর ধারাটি, $a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots$

$$= 3 + 3 \times 3 + 3 \times 3^2 + 3 \times 3^3 + \dots$$

$$= 3 + 9 + 27 + 81 + \dots \text{ (Ans.)}$$

আমরা জানি, গুণোত্তর ধারার প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি,

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \quad [\text{যখন } r > 1]$$

$$\therefore \text{প্রথম } 10 \text{ টি পদের সমষ্টি, } S_{10} = \frac{a(r^{10} - 1)}{r - 1}$$

$$= \frac{3(3^{10} - 1)}{3 - 1}$$

$$= \frac{3 \times 59048}{2}$$

$$= 88572 \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন ৯ একটি গুণোত্তর ধারার ৩য় পদ $\frac{1}{\sqrt{3}}$ এবং ৮ম পদ $\frac{1}{27}$ এবং অপর একটি সমান্তর ধারার ১ম ১০ পদের সমষ্টি ১৫৫ এবং ১ম ২০ পদের সমষ্টি ৬১০।

[রাজশাহী বোর্ড-২০১৭ ৮ প্রশ্ন নং ৩]

ক. $5 + 8 + 11 + 14 + \dots$ ধারাটির কোন পদ ৩৮৩? ২

খ. গুণোত্তর ধারাটি নির্ণয় কর। ৪

গ. সমান্তর ধারাটির ৩০ তম পদ নির্ণয় কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের সমাধান

ক পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনী-১৩.১ এর উদাহরণ-২ দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা- ২৫১

খ ধরি, গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ = a এবং সাধারণ অনুপাত = r

আমরা জানি, গুণোত্তর ধারার n তম পদ = ar^{n-1}

দেওয়া আছে,

$$\text{৩য় পদ} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore ar^{3-1} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } ar^2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \dots \dots (i)$$

$$\text{এবং } ৮ \text{ ম পদ} = \frac{1}{27}$$

$$\text{বা, } ar^{8-1} = \frac{1}{27}$$

$$\text{বা, } ar^7 = \frac{1}{27} \dots \dots (ii)$$

(ii) \div (i) নং থেকে পাই,

$$r^5 = \frac{1}{27} \div \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } r^5 = \frac{1}{(\sqrt{3})^6} \times \sqrt{3}$$

$$\text{বা, } r^5 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^5$$

$$\therefore r = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

(i) নং হতে পাই,

$$a \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \text{বা, } a = \frac{1}{\sqrt{3}} \times 3 \therefore a = \sqrt{3}$$

\therefore গুণোত্তর ধারাটি $a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots$

$$= \sqrt{3} + \sqrt{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + \sqrt{3} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + \sqrt{3} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^3 + \dots$$

$$= \sqrt{3} + 1 + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3} + \dots \dots \text{ (Ans.)}$$

গ মনে করি,

সমান্তর ধারার ১ম পদ = a , সাধারণ অন্তর = d , পদ সংখ্যা = n

আমরা জানি,

$$\text{সমান্তর ধারার } n \text{ পদের সমষ্টি} = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\}$$

দেওয়া আছে, ১ম ১০ পদের সমষ্টি = ১৫৫

$$\text{বা, } \frac{10}{2} \{2a + (10-1)d\} = 155$$

$$\text{বা, } 5(2a + 9d) = 155$$

$$\therefore 2a + 9d = 31 \dots \dots (i)$$

এবং ১ম ২০ পদের সমষ্টি = ৬১০

$$\text{বা, } \frac{20}{2} \{2a + (20-1)d\} = 610$$

$$\text{বা, } 10(2a + 19d) = 610$$

$$\therefore 2a + 19d = 61 \dots \dots \dots (ii)$$

(ii) নং থেকে (i) নং বিয়োগ করে পাই,

$$10d = 30$$

$$\text{বা, } d = \frac{30}{10}$$

$$\therefore d = 3$$

(i) নং এ $d = 3$ বসিয়ে পাই,

$$2a + 9 \cdot 3 = 31$$

$$\text{বা, } 2a + 27 = 31$$

$$\text{বা, } 2a = 4 \therefore a = 2$$

আমরা জানি,

সমান্তর ধারার n তম পদ = $a + (n-1)d$

$$\therefore 30 \text{ তম পদ} = a + (30-1)d = 2 + 29 \cdot 3 = 89 \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন ১০ $3 + a + 9 + \dots + 60$ একটি সমান্তর ধারা।

[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭ ৮ প্রশ্ন নং ৩]

ক. a এর মান নির্ণয় করো। ২

খ. ধারাটির সমষ্টি নির্ণয় করো। ৪

গ. ধারাটির ১ম পদকে ১ম পদ এবং সাধারণ অন্তরকে সাধারণ অনুপাত ধরে একটি গুণোত্তর ধারা গঠন করে তার ১ম ৭টি পদের সমষ্টি সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের সমাধান

ক $3 + a + 9 + \dots + 60$ একটি সমান্তর ধারা

$$\therefore \text{শর্তমতে, } 9 - a = a - 3$$

$$\text{বা, } 2a = 12$$

$$\therefore a = 6 \text{ (Ans.)}$$

খ ধারাটির ১ম পদ, $a = 3$

সাধারণ অন্তর, $d = 6 - 3$ [$a = 6$]

= 3

শেষ পদ = 60

∴ n তম পদ = a + (n - 1).d

বা, 60 = 3 + (n - 1).3

বা, 3 + 3n - 3 = 60

বা, 3n = 60

∴ n = 20

আবার, ধারাটির n পদের সমষ্টি, $S_n = \frac{n}{2} \{2a + (n - 1).d\}$

∴ ধারাটির 20 পদের সমষ্টি, $S_{20} = \frac{20}{2} \{2 \times 3 + (20 - 1).3\}$
 $= 10 \{6 + 19 \times 3\}$
 $= 10 \{6 + 57\} = 10 \times 63$
 $= 630$ (Ans.)

গ) ধরি,

গুণোত্তর ধারাটির 1ম পদ, a = 3

" " সাধারণ অনুপাত, r = 3

আমরা জানি, যেকোনো গুণোত্তর ধারা a + ar + ar² + ...

ধারাটির n তম পদ = arⁿ⁻¹

∴ ধারাটির ২য় " = 3 × 3 = 9

" ৩য় " = 3 × 3² = 27

" ৪র্থ " = 3 × 3³ = 81

∴ গুণোত্তর ধারাটি: 3 + 9 + 27 + 81 + ...

এখন, ধারাটির n সংখ্যক পদের সমষ্টি $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$; যখন r > 1

∴ ধারাটির 9 টি পদের সমষ্টি $S_9 = \frac{3(3^9 - 1)}{3 - 1}$
 $= \frac{3(19683 - 1)}{2}$
 $= 29523$ (Ans.)

প্রশ্ন 11) 7 + x + y + 189 একটি গুণোত্তর ধারা।

[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭ 1/ প্রশ্ন নং ৩]

- ক. ধারাটির চতুর্থ পদকে সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করো যেখানে প্রথম পদ a এবং সাধারণ অনুপাত r। ২
- খ. x এবং y এর মান নির্ণয় করো। ৪
- গ. প্রদত্ত ধারার প্রথম পদকে 1ম পদ এবং সাধারণ অনুপাতকে সাধারণ অন্তর ধরে সমান্তর ধারাটি নির্ণয় করে এর প্রথম 16 টি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো। ৪

11 নং প্রশ্নের সমাধান

ক) এখানে, গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ = a এবং সাধারণ অনুপাত = r
আমরা জানি,

গুণোত্তর ধারার n তম পদ = arⁿ⁻¹

∴ " " ৪র্থ পদ = ar⁴⁻¹ = ar³

সুতরাং, ar³ = 189 (Ans.)

খ) 'ক' থেকে পাই,

∴ ar³ = 189

বা, 7.r³ = 189 [∴ ধারাটির 1ম পদ, a = 7]

বা, r³ = $\frac{189}{7}$

বা, r³ = 27

বা, r³ = 3³

∴ r = 3

∴ দ্বিতীয় পদ = x = ar = 7.3 = 21

এবং তৃতীয় পদ = y = ar² = 7.3² = 63

সুতরাং, x = 21 এবং y = 63 (Ans.)

গ) প্রশ্নানুসারে,

সমান্তর ধারার প্রথম পদ, a = 7 এবং সাধারণ অন্তর, d = 3

∴ সমান্তর ধারাটি, a + (a + d) + (a + 2d) +
 $= 7 + (7 + 3) + (7 + 2.3) + \dots$
 $= 7 + 10 + 13 + \dots$

আমরা জানি, সমান্তর ধারার n পদের সমষ্টি = $\frac{n}{2} \{2a + (n - 1)d\}$

∴ প্রথম 16 পদের সমষ্টি = $\frac{16}{2} \{2.7 + (16 - 1).3\}$
 $= 8 \{14 + 15.3\}$
 $= 8 \{14 + 45\}$
 $= 8 \times 59$
 $= 472$ (Ans.)

প্রশ্ন 12) একটি ধারার n তম পদ 2n - 1, n ∈ I.

[বরিশাল বোর্ড-২০১৭ 1/ প্রশ্ন নং ৩]

- ক. ধারাটি গঠন করো। ২
- খ. ধারাটির কততম পদ 169? ৪
- গ. ধারাটির প্রথম পদ এবং সাধারণ অন্তরকে যথাক্রমে প্রথম পদ ও সাধারণ অনুপাত ধরে একটি গুণোত্তর ধারা গঠন করে নতুন ধারাটির প্রথম 10 টি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো। ৪

12 নং প্রশ্নের সমাধান

ক) দেওয়া আছে, একটি ধারার n তম পদ 2n - 1 এবং n ∈ I
অর্থাৎ n স্বাভাবিক সংখ্যা। সুতরাং, n = 1, 2, 3, 4,

এখন,

n = 1 হলে ধারাটির 1ম পদ = 2.1 - 1 = 2 - 1 = 1

n = 2 হলে ধারাটির ২য় পদ = 2.2 - 1 = 4 - 1 = 3

n = 3 হলে ধারাটির ৩য় পদ = 2.3 - 1 = 6 - 1 = 5

.....

∴ ধারাটি হলো: 1 + 3 + 5 + (Ans.)

খ) প্রাপ্ত ধারাটি, 1 + 3 + 5 +

যার প্রথম পদ a = 1

এবং সাধারণ অন্তর d = 5 - 3 = 3 - 1 = 2

ধরি, ধারাটির n তম পদ 169

প্রশ্নমতে, 2n - 1 = 169

বা, 2n = 169 + 1

বা, 2n = 170

বা, n = $\frac{170}{2}$ ∴ n = 85

∴ ধারাটির 85 তম পদ 169 (Ans.)

গ) শর্তমতে, নতুন ধারার 1ম পদ, a = 1 এবং সাধারণ অনুপাত, r = 2

গুণোত্তর ধারাটি, a + ar + ar² + ar³ +

= 1 + 1.2 + 1.2² + 1.2³ +

= 1 + 2 + 4 + 8 +

নতুন ধারাটির প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি = $\frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$ [যখন r > 1]

∴ 10 টি পদের সমষ্টি = $\frac{1(2^{10} - 1)}{2 - 1} = 2^{10} - 1$
 $= 1024 - 1 = 1023$ (Ans.)

প্রশ্ন 13) 25 + 23 + 21 + ধারাটির 1ম n-সংখ্যক পদের সমষ্টি -456।

[ঢাকা বোর্ড-২০১৬ 1/ প্রশ্ন নং ৩]

- ক. ধারাটির সপ্তম পদ কত? ২
- খ. n এর মান নির্ণয় কর। ৪
- গ. প্রদত্ত ধারার প্রথম পদ ও সাধারণ অন্তরকে যথাক্রমে একটি গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ ও সাধারণ অনুপাত ধরে ধারাটির প্রথম 7 টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪

13 নং প্রশ্নের সমাধান

ক) প্রদত্ত ধারা: 25 + 23 + 21 +

ধারাটির 1ম পদ, a = 25

সাধারণ অন্তর, d = 23 - 25 = 21 - 23 = -2

∴ ধারাটি একটি সমান্তর ধারা।

আমরা জানি, সমান্তর ধারার n তম পদ = a + (n - 1)d

∴ ধারাটির সপ্তম পদ = a + (7 - 1)d
 $= 25 + 6 \times (-2)$
 $= 25 - 12 = 13$ (Ans.)

খ) প্রদত্ত ধারা: 25 + 23 + 21 +

1ম পদ a = 25

সাধারণ অন্তর $d = -2$

আমরা জানি, সমান্তর ধারার n সংখ্যক পদের সমষ্টি

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\} \\ &= \frac{n}{2} \{2 \times 25 + (n-1)(-2)\} \\ &= \frac{n}{2} (50 - 2n + 2) \\ &= \frac{n}{2} (52 - 2n) \\ &= \frac{n}{2} \times 2(26 - n) \\ &= 26n - n^2 \end{aligned}$$

শর্তমতে, $26n - n^2 = -456$

বা, $26n - n^2 + 456 = 0$

বা, $n^2 - 26n - 456 = 0$ [উভয়পক্ষকে (-1) দ্বারা গুণ করে]

বা, $n^2 - 38n + 12n - 456 = 0$

বা, $n(n - 38) + 12(n - 38) = 0$

বা, $(n - 38)(n + 12) = 0$

\therefore হয় $n - 38 = 0$ অথবা, $n + 12 = 0$

\therefore $n = 38$ বা, $n = -12$

কিন্তু পদের সংখ্যা ঋণাত্মক হতে পারে না।

\therefore n এর মান 38 (Ans.)

গ 'ক' থেকে পাই,

প্রদত্ত ধারার প্রথম পদ, $a = 25$

এবং সাধারণ অন্তর = গুণোত্তর ধারার সাধারণ অনুপাত, $r = -2 < 1$

আমরা জানি, গুণোত্তর ধারার n সংখ্যক পদের সমষ্টি

$$S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}, \text{ যখন } r < 1$$

\therefore ধারাটির 1 ম 7 টি পদের সমষ্টি

$$S_7 = \frac{25(1-(-2)^7)}{1-(-2)}$$

$$= \frac{25(1+128)}{1+2} = \frac{25 \times 129}{3} = 1075 \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন 18 $\frac{1}{\sqrt{2}} - 1 + \sqrt{2} - \dots$ একটি গুণোত্তর ধারা।

[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৬ ৷ প্রশ্ন নং ৩]

ক. ধারাটির সাধারণ অনুপাত এবং 8 র্থ পদ কত? ২

খ. ধারাটির কোন পদ $8\sqrt{2}$? ৪

গ. ধারাটির 10 তম পদ এবং প্রথম দশটি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত ধারাটির 1 ম পদ, $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$ এবং 2 য় পদ $= -1$

$$\therefore \text{ সাধারণ অনুপাত, } r = \frac{-1}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = -1 \times \sqrt{2} = -\sqrt{2} \text{ (Ans.)}$$

এবং ধারাটির 8 র্থ পদ $= ar^{4-1}$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} (-\sqrt{2})^{4-1} = \frac{1}{\sqrt{2}} (-\sqrt{2})^3$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2}} \times 2\sqrt{2} = -2 \text{ (Ans.)}$$

খ ধারাটির প্রথম পদ, $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$

এবং 'ক' থেকে পাই, সাধারণ অনুপাত, $r = -\sqrt{2}$

মনে করি, n -তম পদ $= 8\sqrt{2}$

আমরা জানি, n -তম পদ $= ar^{n-1}$

প্রশ্নমতে, $ar^{n-1} = 8\sqrt{2}$

বা, $\frac{1}{\sqrt{2}} (-\sqrt{2})^{n-1} = 8\sqrt{2}$

বা, $(-\sqrt{2})^{n-1} = 16$

বা, $(-\sqrt{2})^{n-1} = (-\sqrt{2})^8$

বা, $n-1 = 8$

$$\therefore n = 9$$

$$\therefore \text{ ধারাটির } 9\text{-তম পদ } 8\sqrt{2} \text{ (Ans.)}$$

গ ধারাটির প্রথম পদ, $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$

এবং 'ক' থেকে পাই, সাধারণ অনুপাত, $r = -\sqrt{2}$

$$\therefore \text{ ধারাটির } 10\text{-তম পদ } = ar^{10-1} = ar^9 = \frac{1}{\sqrt{2}} \times (-\sqrt{2})^9$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2}} \times \sqrt{2}(\sqrt{2})^8$$

$$= -16 \text{ (Ans.)}$$

এবং আমরা জানি, ধারাটির প্রথম n পদের সমষ্টি $= \frac{a(1-r^n)}{1-r}$, [$r < 1$]

$$\therefore \text{ ধারাটির প্রথম দশটি পদের সমষ্টি } = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}} \{1 - (-\sqrt{2})^{10}\}}{1 - (-\sqrt{2})}$$

$$= \frac{\frac{1}{\sqrt{2}} (1 - 32)}{1 + \sqrt{2}}$$

$$= \frac{-31}{\sqrt{2}(1 + \sqrt{2})}$$

$$= \frac{-31 \cdot \sqrt{2}(\sqrt{2} - 1)}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot (\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1)}$$

$$= \frac{-31\sqrt{2}(\sqrt{2} - 1)}{2} \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন 15 একটি সমান্তর ধারার ষষ্ঠ পদ 30 এবং একাদশতম পদ 55।

[সিলেট বোর্ড-২০১৬ ৷ প্রশ্ন নং ২]

ক. প্রথম পদকে a এবং সাধারণ অন্তরকে 'd' ধরে দুইটি সমীকরণ গঠন কর। ২

খ. উদ্দিপক অনুসারে ধারাটি গঠন কর। ৪

গ. যদি ধারাটির n -সংখ্যক পদের সমষ্টি 6375 হয়, তবে n -এর মান নির্ণয় কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের সমাধান

ক আমরা জানি, কোন সমান্তর ধারার 1 ম পদ a এবং সাধারণ অন্তর d হলে,

$$n\text{-তম পদ} = a + (n-1)d$$

$$\therefore \text{ ষষ্ঠ পদ} = a + (6-1)d = 30$$

বা, $a + 5d = 30$ (i)

এবং একাদশতম পদ $= a + (11-1)d = 55$

বা, $a + 10d = 55$ (ii)

(i) ও (ii)-ই নির্ণয় সমীকরণদ্বয়।

খ 'ক' হতে পাই,

SSC গণিত মেইড ইজি উত্তরপত্র-১১গ(iii)

এবং $a + 5d = 30$ (iv)

$$\begin{array}{r} (-) \quad (-) \quad (-) \\ \hline 5d = 25 \text{ [বিয়োগ করে]} \end{array}$$

বা, $d = \frac{25}{5} \therefore d = 5$

d এর মান (iii) নং এ বসিয়ে পাই,

$a + 10 \times 5 = 55$

বা, $a + 50 = 55$

বা, $a = 55 - 50$

$\therefore a = 5$

\therefore ধারাটির 1 ম পদ, $a = 5$

" 2 য় পদ, $a + d = 5 + 5 = 10$

" 3 য় পদ, $a + 2d = 5 + 2 \times 5 = 15$

" 8 র্থ পদ, $a + 3d = 5 + 3 \times 5 = 20$

.....

.....

\therefore নির্ণয় ধারাটি: $5 + 10 + 15 + 20 + \dots$ (Ans.)

গ 'খ' হতে পাই,

ধারাটির 1 ম পদ, $a = 5$

এবং সাধারণ অন্তর, $d = 5$

পদের সমষ্টি = $\frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\}$

প্রশ্নমতে, $\frac{n}{2} \{2.5 + (n-1)5\} = 6375$

বা, $n(10 + 5n - 5) = 6375 \times 2$

বা, $n(5n + 5) = 12750$

বা, $5n^2 + 5n - 12750 = 0$

বা, $n^2 + n - 2550 = 0$ [উভয়পক্ষকে 5 দ্বারা ভাগ করে]

বা, $n^2 + 51n - 50n - 2550 = 0$

বা, $n(n + 51) - 50(n + 51) = 0$

বা, $(n + 51)(n - 50) = 0$

হয় $n + 51 = 0$ অথবা, $n - 50 = 0$

বা, $n = -51$ বা, $n = 50$

কিন্তু $n = -51$ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পদসংখ্যা ঋণাত্মক হতে পারে না।

$\therefore n = 50$ (Ans.)

প্রশ্ন 16 $33 + 29 + 25 + \dots - 19$ একটি ধারা এবং $m = \frac{\sqrt{1+y} + \sqrt{1-y}}{\sqrt{1+y} - \sqrt{1-y}}$

সম্বিত অধ্যায় ১১ ও ১৩

[যশোর বোর্ড-২০১৬ ৷ প্রশ্ন নং ৩]

- ক. ধারাটির 12তম পদ কত? ২
- খ. প্রমাণ কর যে, $m^2 - \frac{2m}{y} + 1 = 0$ ৪
- গ. ধারাটির ১ম পদকে ১ম পদ এবং সাধারণ অন্তরকে সাধারণ অনুপাত ধরে একটি গুণোত্তর ধারা গঠন কর এবং ধারাটির ১ম পাঁচ পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত ধারা, $33 + 29 + 25 + \dots - 19$
ইহা একটি সমান্তর ধারা। ইহার,
১ম পদ, $a = 33$
এবং সাধারণ অন্তর, $d = 29 - 33 = -4$
আমরা জানি, কোন সমান্তর ধারার n-তম পদ $= a + (n-1)d$
 \therefore প্রদত্ত ধারার 12-তম পদ $= 33 + (12-1)(-4)$
 $= 33 + 11(-4)$
 $= 33 - 44$
 $= -11$ (Ans.)

খ দেওয়া আছে, $m = \frac{\sqrt{1+y} + \sqrt{1-y}}{\sqrt{1+y} - \sqrt{1-y}}$
 $\therefore \frac{m+1}{m-1} = \frac{\sqrt{1+y} + \sqrt{1-y} + \sqrt{1+y} - \sqrt{1-y}}{\sqrt{1+y} + \sqrt{1-y} - \sqrt{1+y} + \sqrt{1-y}}$
[যোজন-বিয়োজন করে]

বা, $\frac{m+1}{m-1} = \frac{2\sqrt{1+y}}{2\sqrt{1-y}}$

বা, $\frac{m+1}{m-1} = \frac{\sqrt{1+y}}{\sqrt{1-y}}$

বা, $\frac{(m+1)^2}{(m-1)^2} = \frac{(\sqrt{1+y})^2}{(\sqrt{1-y})^2}$ [উভয়পক্ষকে বর্গ করে]

বা, $\frac{m^2 + 2m + 1}{m^2 - 2m + 1} = \frac{1+y}{1-y}$

বা, $\frac{m^2 + 2m + 1 + m^2 - 2m + 1}{m^2 + 2m + 1 - m^2 + 2m - 1} = \frac{1+y+1-y}{1+y-1-y}$

[যোজন-বিয়োজন করে]

বা, $\frac{2(m^2 + 1)}{2.2m} = \frac{2}{2y}$

বা, $\frac{m^2 + 1}{2m} = \frac{1}{y}$

বা, $m^2 + 1 = \frac{2m}{y}$

$\therefore m^2 - \frac{2m}{y} + 1 = 0$. (প্রমাণিত)

গ প্রদত্ত ধারাটির ১ম পদকে ১ম পদ এবং সাধারণ অন্তরকে সাধারণ অনুপাত ধরে পাই, $a = 33$ এবং $r = -4$

\therefore গুণোত্তর ধারাটির ১ম পদ $= a = 33$

" " ২য় " $= ar = 33(-4) = -132$

" " ৩য় " $= ar^2 = 33(-4)^2 = 528$

" " ৪র্থ " $= ar^3 = 33(-4)^3 = -2112$

\therefore নির্ণেয় গুণোত্তর ধারাটি, $33 - 132 + 528 - 2112 + \dots$ (Ans.)

যেহেতু, $r = -4 < 1$.

সুতরাং, প্রাপ্ত গুণোত্তর ধারার ১ম পাঁচটি পদের সমষ্টি

$$S_5 = \frac{33 \{1 - (-4)^5\}}{1 - (-4)} \left[\square S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}; \square r < 1 \right]$$

$$= \frac{33(1 + 1024)}{1 + 4}$$

$$= \frac{33 \times 1025}{5}$$

$$= 33 \times 205 = 6765$$
 (Ans.)

প্রশ্ন 19 একটি সমান্তর ধারার ১ম পদ 5 এবং সাধারণ অন্তর 6.

[বরিশাল বোর্ড-২০১৬ ৷ প্রশ্ন নং ৩]

- ক. ধারাটি নির্ণয় কর। ২
- খ. ধারাটির ১ম n সংখ্যক পদের সমষ্টি 705 হলে n এর মান নির্ণয় কর। ৪
- গ. ধারাটির সাধারণ অন্তরকে ১ম পদ এবং ১ম পদকে সাধারণ অনুপাত ধরে গঠিত গুণোত্তর ধারার ১ম 7টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, ধারাটির প্রথম পদ $a = 5$
এবং সাধারণ অন্তর $d = 6$
 \therefore ধারাটির ২য় পদ $= a + d = 5 + 6 = 11$
 \therefore ধারাটির ৩য় পদ $= a + 2d = 5 + 2 \cdot 6 = 5 + 12 = 17$
 \therefore ধারাটি $= 5 + 11 + 17 + \dots$ (Ans.)

খ দেওয়া আছে, ধারাটির প্রথম পদ $a = 5$
এবং সাধারণ অন্তর $d = 6$
এবং ১ম n সংখ্যক পদের সমষ্টি $= 705$
আমরা জানি, কোন সমান্তর ধারার ১ম পদ a এবং সাধারণ অন্তর d হলে, ১ম n

সংখ্যক পদের সমষ্টি $= \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\}$

প্রশ্নমতে, $\frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\} = 705$

বা, $\frac{n}{2} \{2.5 + (n-1)6\} = 705$

বা, $\frac{n}{2} \{2(5 + 3n - 3)\} = 705$

বা, $n(3n + 2) = 705$

বা, $3n^2 + 2n - 705 = 0$

বা, $3n^2 + 47n - 45n - 705 = 0$

বা, $n(3n + 47) - 15(3n + 47) = 0$

বা, $(3n + 47)(n - 15) = 0$

হয় $3n + 47 = 0$ অথবা $n - 15 = 0$

বা, $3n = -47$ বা, $n = 15$

বা, $n = -\frac{47}{3}$

যেহেতু পদ সংখ্যা ঋণাত্মক ও ভগ্নাংশ হতে পারে না।

$\therefore n = 15$ (Ans.)

গ ধরি গুণোত্তর ধারার ১ম পদ a

এবং সাধারণ অনুপাত q

শর্তমতে, $a = 6$ এবং $q = 5$

\therefore ধারাটির ১ম 7টি পদের সমষ্টি $= \frac{a(q^7 - 1)}{q - 1}$ [$\because q > 1$]

$$= \frac{6(5^7 - 1)}{5 - 1}$$

$$= \frac{6(78125 - 1)}{4}$$

$$= \frac{6 \times 78124}{4}$$

$$= 117186 \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন ১৮ 25 + 23 + 21 + + 13 একটি সমান্তর ধারা এবং 1, 2, 3, স্বাভাবিক সংখ্যা।

[মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল // প্রশ্ন নং ৩]

- ক. সমান্তর ধারাটির পদসংখ্যা নির্ণয় কর। ২
- খ. সমান্তর ধারাটির প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি 169 হলে, n এর মান নির্ণয় কর। 8
- গ. প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি 441 হলে n এর মান নির্ণয় কর এবং ঐ সংখ্যাগুলোর সমষ্টি নির্ণয় কর। 8

১৮ নং প্রশ্নের সমাধান

ক 25 + 23 + 21 + + 13

সমান্তর ধারাটির প্রথম পদ, a = 25

সাধারণ অন্তর, d = 23 - 25 = -2

ধরি, n-তম পদ = 13

বা, a + (n - 1)d = 13

বা, 25 + (n - 1)(-2) = 13

বা, 25 - 2n + 2 = 13

বা, 2n = 14

∴ n = 7

অর্থাৎ পদসংখ্যা 7 (Ans.)

খ সমান্তর ধারাটির প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি,

$$S_n = \frac{n}{2} \{2a + (n - 1)d\}$$

প্রশ্নমতে, $\frac{n}{2} \{2a + (n - 1)d\} = 169$ SSC গণিত মেইড ইজি উত্তরপত্র-১১খ

$$\text{বা, } \frac{n}{2} \{2 \times 25 + (n - 1)(-2)\} = 169$$

$$\text{বা, } n(25 - n + 1) = 169$$

$$\text{বা, } 26n - n^2 = 169$$

$$\text{বা, } n^2 - 26n + 169 = 0$$

$$\text{বা, } (n - 13)^2 = 0$$

$$\text{বা, } n - 13 = 0$$

$$\therefore n = 13 \text{ (Ans.)}$$

গ দেওয়া আছে,

প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি = 441

আমরা জানি,

$$\text{প্রথম } n \text{ সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি} = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2 = 441$$

$$\text{বা, } \frac{n^2 + n}{2} = \sqrt{441} \text{ [বর্গমূল করে]}$$

$$\text{বা, } \frac{n^2 + n}{2} = 21$$

$$\text{বা, } n^2 + n = 42$$

$$\text{বা, } n^2 + n - 42 = 0$$

$$\text{বা, } n^2 + 7n - 6n - 42 = 0$$

$$\text{বা, } n(n + 7) - 6(n + 7) = 0$$

$$\text{বা, } (n + 7)(n - 6) = 0$$

$$\therefore (n + 7)(n - 6) = 0$$

$$\text{হয়, } n + 7 = 0$$

$$\text{অথবা, } n - 6 = 0$$

$$\text{বা, } n = -7$$

$$\text{বা, } n = 6$$

$$\therefore n = -7$$

$$\therefore n = 6$$

[n = -7 গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ পদসংখ্যা ঋণাত্মক হতে পারে না।]

আবার, প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি, $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$

$$\therefore \text{প্রথম } 6 \text{ টি স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি, } S_6 = \frac{6(6+1)}{2} = 3 \times 7 = 21$$

Ans. n = 6 এবং S = 21

প্রশ্ন ১৯ (i) একটি গুণোত্তর ধারার পঞ্চম ও দশম পদ যথাক্রমে $\frac{2\sqrt{3}}{9}$ এবং $\frac{8\sqrt{2}}{81}$ ।

(ii) P = 9 + 7 + 5 + ... + n; যেখানে n ∈ |

[রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, রাজশাহী // প্রশ্ন নং ৩]

- ক. একটি সমান্তর ধারার ষষ্ঠ পদ 55 হলে ধারাটির প্রথম 11টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ২
- খ. (i) হতে চতুর্থ পদ নির্ণয় কর। 8
- গ. (ii) এ P = -144 হলে n এর মান নির্ণয় কর। ঐ সংখ্যক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি নির্ণয় কর। 8

১৯ নং প্রশ্নের সমাধান

ক ধরি, সমান্তর ধারাটির প্রথম পদ a এবং সাধারণ অন্তর d.

n-তম পদ = a + (n - 1)d

∴ ষষ্ঠ (n = 6) পদ = a + (6 - 1)d = a + 5d

প্রশ্নমতে, a + 5d = 55

∴ ধারাটির প্রথম 11টি পদের সমষ্টি = $\frac{11}{2} \{2a + (11 - 1)d\}$

$$= \frac{11}{2} (2a + 10d)$$

$$= \frac{11}{2} \times 2 (a + 5d)$$

$$= 11 \times 55 = 605 \text{ (Ans.)}$$

খ মনে করি, ধারাটির প্রথম পদ = a

এবং সাধারণ অনুপাত = r.

আমরা জানি, n তম পদ = arⁿ⁻¹

পঞ্চম পদ = ar⁵⁻¹ = ar⁴

এবং দশম পদ = ar¹⁰⁻¹ = ar⁹

প্রশ্নমতে, ar⁴ = $\frac{2\sqrt{3}}{9}$... (i) এবং ar⁹ = $\frac{8\sqrt{2}}{81}$... (ii)

(ii) নং কে (i) নং দ্বারা ভাগ করে পাই,

$$\frac{ar^9}{ar^4} = \frac{\frac{8\sqrt{2}}{81}}{\frac{2\sqrt{3}}{9}}$$

$$\text{বা, } r^5 = \frac{8\sqrt{2}}{81} \times \frac{9}{2\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } r^5 = \frac{4\sqrt{2}}{9\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } r^5 = \frac{(\sqrt{2})^4 \times \sqrt{2}}{(\sqrt{3})^4 \times \sqrt{3}} = \frac{(\sqrt{2})^5}{(\sqrt{3})^5}$$

$$\text{বা, } r^5 = \left(\sqrt{\frac{2}{3}} \right)^5$$

$$\therefore r = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

এখন, (i) নং এ r এর মান বসিয়ে পাই,

$$a \left(\sqrt{\frac{2}{3}} \right)^4 = \frac{2\sqrt{3}}{9}$$

$$\text{বা, } a \times \frac{2^2}{3^2} = \frac{2\sqrt{3}}{9}$$

$$\text{বা, } \frac{4a}{9} = \frac{2\sqrt{3}}{9}$$

$$\text{বা, } a = \frac{2\sqrt{3}}{4}$$

$$\therefore a = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

∴ চতুর্থ পদ = ar⁴⁻¹

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\sqrt{\frac{2}{3}} \right)^3$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{3}}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{3} \text{ (Ans.)}$$

গ প্রশ্নমতে, 9 + 7 + 5 + + n = P = -144

প্রদত্ত ধারাটি, 9 + 7 + 5 + ...

যার প্রথম পদ, a = 9 এবং সাধারণ অন্তর, d = 7 - 9 = -2

∴ এটি একটি সমান্তর ধারা।

আমরা জানি, সমান্তর ধারার প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি,

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\} \\ &= \frac{n}{2} \{2 \cdot 9 + (n-1)(-2)\} \text{ [মান বসিয়ে]} \\ &= \frac{n}{2} (18 + 2 - 2n) \\ &= \frac{n}{2} (20 - 2n) \\ &= n(10 - n) \end{aligned}$$

প্রশ্নমতে, n(10 - n) = -144

বা, 10n - n² + 144 = 0

বা, n² - 10n - 144 = 0 [উভয়পক্ষকে (-1) দ্বারা গুণ করে]

বা, n² - 18n + 8n - 144 = 0

বা, n(n-18) + 8(n-18) = 0

বা, (n+8)(n-18) = 0

বা, n - 18 = 0 [n + 8 ≠ 0 কারণ পদসংখ্যা ঋণাত্মক হতে পারে না]

∴ n = 18 (Ans.)

উদ্দীপকের সমান্তর ধারাটির n-তম পদ = 9 + (n-1)(-2)

$$= 9 - 2n + 2$$

$$= 11 - 2n$$

∴ নির্ণেয় ধারাটির n-তম পদ (11 - 2n)² = 11² - 2 \cdot 11 \cdot 2n + (2n)²

$$= 121 - 44n + 4n² \dots \dots (i)$$

(i) নং এ n = 1, 2, 3, \dots \dots 18 বসিয়ে পাই,

$$n = 1 \text{ হলে, } 9^2 = 121 - 44 \cdot 1 + 4 \cdot 1^2$$

$$n = 2 \text{ হলে, } 7^2 = 121 - 44 \cdot 2 + 4 \cdot 2^2$$

$$n = 3 \text{ হলে, } 5^2 = 121 - 44 \cdot 3 + 4 \cdot 3^2$$

.....

.....

$$n = 18 \text{ হলে, } (-25)^2 = 121 - 44 \cdot 18 + 4 \cdot 18^2$$

$$9^2 + 7^2 + 5^2 + \dots \dots + (-25)^2 = 121(1 + 1 + 1 + \dots \dots 18 \text{ তম পদ পর্যন্ত})$$

$$- 44(1 + 2 + 3 + \dots \dots + 18) + 4(1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots \dots + 18^2)$$

$$= 121 \times 18 - 44 \times \frac{18 \times (18 + 1)}{2} + 4 \times \frac{18(18 + 1)(2 \times 18 + 1)}{6}$$

$$= 2178 - 7524 + 8436$$

$$= 3090 \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন ২০ (i) একটি গুণোত্তর ধারার চতুর্থ পদ $\frac{1}{4}$ এবং দশম পদ $\frac{1}{64}$

(ii) a = 18 মি. এবং b = 12 মি.

সমস্বিত অধ্যায় ১, ১১ ও ১৩

[পাবনা ক্যাডেট কলেজ, পাবনা ৷ প্রশ্ন নং ৩]

ক. যোগ কর : $0.4\bar{5} + 0.1\bar{34}$ ২

খ. ধারাটি নির্ণয় কর এবং ধারাটির 12-তম পদ নির্ণয় কর। 8

গ. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে a এবং b। দৈর্ঘ্য 10% বৃদ্ধি এবং প্রস্থ 10% হ্রাস পেলে আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি বা হ্রাস পাবে? 8

২০ নং প্রশ্নের সমাধান

ক. $0.4\bar{5} + 0.1\bar{34}$

এখানে, অনাবৃত্ত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে 1 এবং আবৃত্ত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে 2।

$$\begin{array}{r|l} 0.4\bar{5} = 0.45\bar{5} & 55 \\ 0.1\bar{34} = 0.1\bar{34} & 34 \\ \hline & 0.58\bar{9} & 89 \end{array}$$

∴ নির্ণেয় যোগফল = 0.589 (Ans.)

খ. ধরি, গুণোত্তর ধারাটির প্রথম পদ a এবং সাধারণ অনুপাত r.

আমরা জানি, n-তম পদ = arⁿ⁻¹

$$\therefore \text{চতুর্থ (n = 4) পদ} = ar^{4-1} = ar^3$$

$$\therefore \text{দশম (n = 10) পদ} = ar^{10-1} = ar^9$$

শর্তমতে, ar³ = $\frac{1}{4}$ \dots \dots (i)

$$ar^9 = \frac{1}{64} \dots \dots (ii)$$

(ii) ÷ (i) করে পাই, $\frac{ar^9}{ar^3} = \frac{\frac{1}{64}}{\frac{1}{4}}$

$$\text{বা, } r^6 = \frac{1}{16}$$

$$\therefore r = (2^{-4})^{\frac{1}{6}} = 2^{-\frac{2}{3}}$$

r এর মান (i) নং এ বসিয়ে,

$$a \left(2^{-\frac{2}{3}}\right)^3 = \frac{1}{4}$$

$$\text{বা, } a \cdot 2^{-2} = \frac{1}{4}$$

$$\text{বা, } a \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

∴ a = 1

∴ গুণোত্তর ধারাটি : a + ar + ar² + ar³ + \dots \dots

$$= 1 + 1 \left(2^{-\frac{2}{3}}\right) + 1 \left(2^{-\frac{2}{3}}\right)^2 + 1 \left(2^{-\frac{2}{3}}\right)^3 + \dots \dots$$

$$= 1 + 2^{-\frac{2}{3}} + 2^{-\frac{4}{3}} + 2^{-2} + \dots \dots$$

$$= 1 + 2^{-\frac{2}{3}} + 4^{-\frac{2}{3}} + 8^{-\frac{2}{3}} + \dots \dots \text{ (Ans.)}$$

∴ ধারাটির 12-তম পদ = ar¹²⁻¹ = ar¹¹ = 1. $\left(2^{-\frac{2}{3}}\right)^{11}$

$$= \frac{1}{\sqrt[3]{2^{22}}} \text{ (Ans.)}$$

গ. দেওয়া আছে, আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য, a = 18 মি.

এবং প্রস্থ, b = 12 মি.

∴ আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল = 18 × 12 = 216 বর্গ মি.

10% বৃদ্ধিতে দৈর্ঘ্য = 18 + 18 এর 10%

$$= 18 + 1.8 = 19.8 \text{ মি.}$$

10% হ্রাসে প্রস্থ = 12 - 12 এর 10%

$$= 12 - 1.2$$

$$= 10.8 \text{ মি.}$$

∴ নতুন ক্ষেত্রফল = 19.8 × 10.8

$$= 213.84 \text{ বর্গ মি.}$$

∴ ক্ষেত্রফল হ্রাস পায় = (216 - 213.84) = 2.16 বর্গ মি.

$$\therefore \text{শতকরা ক্ষেত্রফল হ্রাস পায়} = \frac{2.16}{216} \times 100\%$$

$$= 1\% \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন ২১ দৃশ্যকল্প-I : $\frac{p}{q} = \frac{q}{r} = \frac{r}{s}$

$$\text{দৃশ্যকল্প-II : } 7x + 2y = 20$$

$$3x - 4y = -6$$

$$\text{দৃশ্যকল্প-III : } 7 + 12 + 17 + 22 + \dots \dots + n = 1090$$

সমস্বিত অধ্যায় ১১, ১২ ও ১৩

[রংপুর ক্যাডেট কলেজ, রংপুর ৷ প্রশ্ন নং ৩]

ক. দৃশ্যকল্প-I হতে দেখাও যে, (p² + q² + r²)(q² + r² + s²) = (pq + qr + rs)² ২

খ. দৃশ্যকল্প-II এ বর্ণিত সমীকরণ জোড়টি বজ্রগুণন পদ্ধতিতে সমাধান কর। 8

গ. দৃশ্যকল্প-III হতে n এর মান নির্ণয় কর। 8

২১ নং প্রশ্নের সমাধান

ক. অধ্যায়-১১ এর সৃজনশীল ৫(গ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা-২৭৯

খ. অধ্যায়-১২ এর সৃজনশীল ৩(খ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা-৩০৩

গ. সৃজনশীল ৭(গ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ২২ $6 + x + y + z + \frac{3}{8}$ একটি গুণোত্তর ধারা। একটি সমান্তর ধারার ষষ্ঠ পদ 30 এবং একাদশ তম পদ 55।

- ক. সমান্তর ও গুণোত্তর ধারার সংজ্ঞা দাও। ২
 খ. x, y ও z এর মান নির্ণয় কর। ৪
 গ. সমান্তর ধারাটির প্রথম n -সংখ্যক পদের সমষ্টি 6375 হলে n এর মান নির্ণয় কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের সমাধান

- ক. সমান্তর ধারা: কোন ধারার যেকোনো পদ ও তার পূর্ববর্তী পদের পার্থক্য সব সময় সমান হলে সেই ধারাটিকে সমান্তর ধারা বলে।
 গুণোত্তর ধারা: কোন ধারার যেকোনো পদ ও পূর্ববর্তী পদের অনুপাত সব সময় সমান হলে সে ধারাটিকে গুণোত্তর ধারা বলে।

- খ. গুণোত্তর ধারাটির প্রথম পদ, $a = 6$
 সাধারণ অনুপাত = r

n -তম পদ = ar^{n-1}

\therefore পঞ্চম ($n = 5$) পদ = ar^{5-1}

বা, $\frac{3}{8} = 6 \times r^4$

বা, $r^4 = \frac{1}{16}$

বা, $r^4 = \left(\pm \frac{1}{2}\right)^4$

$\therefore r = \pm \frac{1}{2}$

$r = \frac{1}{2}$ হলে, দ্বিতীয় ($n = 2$) পদ, $x = 6 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{2-1} = 3$

তৃতীয় ($n = 3$) পদ, $y = 6 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{3-1} = \frac{3}{2}$

চতুর্থ ($n = 4$) পদ, $z = 6 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{4-1} = \frac{3}{4}$

$r = -\frac{1}{2}$ হলে, দ্বিতীয় ($n = 2$) পদ, $x = 6 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^{2-1} = -3$

তৃতীয় ($n = 3$) পদ, $y = 6 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^{3-1} = \frac{3}{2}$

চতুর্থ ($n = 4$) পদ, $z = 6 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^{4-1} = -\frac{3}{4}$

\therefore নির্ণেয় মান: $x = 3$ অথবা -3

$y = \frac{3}{2}$

$z = \frac{3}{4}$ অথবা $-\frac{3}{4}$

- গ. সূজনশীল ১৫(গ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ২৩ $\log 2 + \log 4 + \log 8 + \dots$ একটি ধারা এবং একটি গুণোত্তর ধারার অষ্টম ও একাদশতম পদ যথাক্রমে -27 এবং $81\sqrt{3}$.

- ক. সমান্তর ধারার সাধারণ পদের সংজ্ঞা দাও। ২
 খ. ধারাটির প্রথম 12টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪
 গ. গুণোত্তর ধারাটির প্রথম 10টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের সমাধান

- ক. সাধারণ পদ:
 কোনো সমান্তর ধারার ১ম পদ a , সাধারণ অন্তর d হলে, ধারাটির n -তম পদ = $a + (n-1)d$, যাকে সমান্তর ধারাটির সাধারণ পদ বলা হয়।

খ. প্রদত্ত ধারাটি, $\log 2 + \log 4 + \log 8 + \dots$

এখানে, প্রথম পদ, $a = \log 2$

২য় পদ - ১ম পদ = $\log 4 - \log 2$

= $\log \frac{4}{2} = \log 2$

৩য় পদ - ২য় পদ = $\log 8 - \log 4$

= $\log \frac{8}{4} = \log 2$

এবং সাধারণ অন্তর, $d = \log 2$

\therefore এটি একটি সমান্তর ধারা।

পদসংখ্যা, $n = 12$

আমরা জানি, সমান্তর ধারার n সংখ্যক পদের সমষ্টি,

$S_n = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\}$

বা, $S_{12} = \frac{12}{2} \{2\log 2 + (12-1)\log 2\}$
 = $6 \{2\log 2 + 11\log 2\}$
 = $6 \times 13\log 2$
 = $78\log 2$ (Ans.)

- গ. মনে করি, গুণোত্তর ধারাটির ১ম পদ = a

এবং সাধারণ অনুপাত = r

\therefore ধারাটির অষ্টম ($n = 8$) পদ, $ar^{8-1} = -27$

বা, $ar^7 = -27 \dots \dots (i)$

এবং একাদশ ($n = 11$) তম পদ, $ar^{11-1} = 81\sqrt{3}$

বা, $ar^{10} = 81\sqrt{3} \dots \dots (ii)$

সমীকরণ (ii) কে (i) দ্বারা ভাগ করে পাই,

$\frac{ar^{10}}{ar^7} = \frac{81\sqrt{3}}{-27}$

বা, $r^3 = -3\sqrt{3}$

বা, $r^3 = (-\sqrt{3})^3$

$\therefore r = -\sqrt{3}$

r এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$a(-\sqrt{3})^7 = -27$

বা, $a(-27\sqrt{3}) = -27$

বা, $a = \frac{-27}{-27\sqrt{3}}$

$\therefore a = \frac{1}{\sqrt{3}}$

আমরা জানি,

গুণোত্তর ধারার প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি,

$S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}, r < 1$

\therefore ধারাটির প্রথম 10টি পদের সমষ্টি

$S_{10} = \frac{\frac{1}{\sqrt{3}} \{1 - (-\sqrt{3})^{10}\}}{1 - (-\sqrt{3})}$
 = $\frac{\frac{1}{\sqrt{3}} (-242)}{1 + \sqrt{3}} = \frac{-242}{\sqrt{3}(\sqrt{3} + 1)}$
 = $\frac{-242\sqrt{3}(\sqrt{3} - 1)}{3\{(\sqrt{3})^2 - (1)^2\}}$
 = $\frac{-121\sqrt{3}(\sqrt{3} - 1)}{3}$ (Ans.)

প্রশ্ন ২৪ $\frac{1}{\sqrt{5}}, -1, \sqrt{5}, \dots$ একটি অনুক্রম এবং

$(ax - cy, a^2 - c^2) = (0, ay - cx)$

◀সম্বন্ধিত অধ্যায় ১২ ও ১৩

- ক. অনুক্রমটির ৪র্থ পদ নির্ণয় কর। ২
 খ. অনুক্রমটির কততম পদ $625\sqrt{5}$? ৪
 গ. উদ্দীপকের সমীকরণ জোটেকে বজ্রগুণন পদ্ধতিতে সমাধান কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের সমাধান

- ক. অনুক্রমটির প্রথম পদ, $a = \frac{1}{\sqrt{5}}$

সাধারণ অনুপাত, $r = \frac{-1}{\frac{1}{\sqrt{5}}} = -\sqrt{5}$

\therefore চতুর্থ ($n = 4$) পদ = ar^{4-1}

= $\frac{1}{\sqrt{5}} (-\sqrt{5})^3$

= $\frac{1}{\sqrt{5}} (-5\sqrt{5})$

= -5 (Ans.)

খ. ধরি, n-তম পদ = $625\sqrt{5}$

বা, $ar^{n-1} = 625\sqrt{5}$

বা, $\frac{1}{\sqrt{5}}(-\sqrt{5})^{n-1} = 625\sqrt{5}$

বা, $(-\sqrt{5})^{n-1} = 3125$

বা, $(-\sqrt{5})^{n-1} = (-\sqrt{5})^{10}$

বা, $n - 1 = 10$

∴ $n = 11$

∴ অনুক্রমটির 11-তম পদ $625\sqrt{5}$ । (Ans.)

গ. $(ax - cy, a^2 - c^2) = (0, ay - cx)$

ক্রমজোড়ের সংজ্ঞানুসারে,

$ax - cy = 0$ (i)

এবং $ay - cx = a^2 - c^2$

∴ $cx - ay + (a^2 - c^2) = 0$ (ii)

(i) ও (ii) নং থেকে বজ্রগুণন পদ্ধতিতে,

$$\frac{x}{-c(a^2 - c^2) - (-a) \cdot 0} = \frac{y}{c \cdot 0 - a(a^2 - c^2)} = \frac{1}{a(-a) - c(-c)}$$

বা, $\frac{x}{c(c^2 - a^2)} = \frac{y}{a(c^2 - a^2)} = \frac{1}{c^2 - a^2}$

বা, $\frac{x}{c} = \frac{y}{a} = 1$

বা, $\frac{x}{c} = 1$ | এবং $\frac{y}{a} = 1$

∴ $x = c$ | ∴ $y = a$

∴ নির্ণয় সমাধান $(x, y) = (c, a)$

প্রশ্ন-২৫ দুপুর 1টা 15 মিনিটে 1 জন এস.এস.সি পরীক্ষার রেজাল্ট জানতে পারল। 1টা 20 মিনিটে জানলো 8 জন, 1টা 25 মিনিটে জানলো 27 জন। এভাবে রেজাল্ট ছড়িয়ে পড়ল। [বিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, বিনাইদহ 1/ প্রশ্ন নং ৩]

ক. গুণোত্তর ধারার প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ। ২

খ. 2টা 10 মিনিট পর্যন্ত মোট কত জন রেজাল্ট জানতে পারবে? 8

গ. কয়টার সময় 6175225 জন রেজাল্ট জানতে পারবে? 8

২৫ নং প্রশ্নের সমাধান

ক. গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ a এবং সাধারণ অনুপাত r হলে,

ধারাটির প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি, $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$ যখন $r > 1$

এবং $S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}$ যখন $r < 1$

খ. প্রথম ক্ষেত্রে প্যাটার্ন হবে:

1টা 15 মি., 1টা 20 মি., 1টা 25 মি. ...

এক্ষেত্রে সাধারণ অন্তর = 1টা 20 মি. - 1টা 15 মি. = 5 মিনিট

1টা 15 মি. থেকে 2টা 10 মি. পর্যন্ত প্যাটার্নের পদসংখ্যা

= $\frac{2\text{টা } 10\text{ মিনিট} - 1\text{টা } 15\text{ মিনিট}}{5\text{ মিনিট}} + 1$ [সমান্তর ধারার nতম পদ = $a + (n-1)d$ সূত্র প্রয়োগ করে]

= $\frac{55\text{ মিনিট}}{5\text{ মিনিট}} + 1 = 12$

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্যাটার্ন হবে: 1, 8, 27, ...

এখন, রেজাল্ট জানতে পারা শিক্ষার্থীদের ধারা,

$1 + 8 + 27 + \dots = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots$

ধারাটির 1ম পদ $a = 1$

ধারাটির 2য় পদ = $8 = 2^3$

ধারাটির 12তম পদ = $12^3 = 1728$ জন।

∴ 2টা 10মিনিটে রেজাল্ট জানতে পারে 1728 জন।

আমরা জানি,

প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি, $S_n = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$

∴ প্রথম 12টি পদের ঘনের সমষ্টি $S_{12} = \left\{ \frac{12(12+1)}{2} \right\}^2$
 $= \left\{ \frac{12(12+1)}{2} \right\}^2$
 $= (6 \times 13)^2$

$= (78)^2 = 6084$

∴ 2টা 10 মি. পর্যন্ত রেজাল্ট জানতে পারবে মোট 6084 জন শিক্ষার্থী।

(Ans.)

গ. মনে করি, n সংখ্যক পদের সমষ্টি = 6175225

আমরা জানি,

n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি, $S_n = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$

প্রশ্নমতে, $\left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2 = 6175225$

বা, $\frac{n(n+1)}{2} = 2485$ [বর্গমূল করে]

বা, $n(n+1) = 4970$

বা, $n^2 + n - 4970 = 0$

বা, $n^2 + 71n - 70n - 4970 = 0$

বা, $n(n+71) - 70(n+71) = 0$

∴ $(n+71)(n-70) = 0$

হয়, $n+71 = 0$ অথবা, $n-70 = 0$

∴ $n = -71$ ∴ $n = 70$

[∴ $n = -71$ গ্রহণযোগ্য নয় কারণ পদসংখ্যা ঋণাত্মক হতে পারে না।]

∴ 1ম প্যাটার্নের জন্য 70তম পদ = 1টা 15 মি. + (70-1)5 মিনিট
 $= 1\text{টা } 15\text{ মি.} + 345\text{ মিনিট}$
 $= 1\text{টা } 15\text{ মি.} + 5\text{ ঘণ্টা } 45\text{ মিনিট}$
 $= 7\text{টা}$

∴ সন্ধ্যা 7 টার সময় 6175225 জন রেজাল্ট জানতে পারবে। (Ans.)

প্রশ্ন-২৬ দৃশ্যকল্প-১ : $\frac{a+x-\sqrt{a^2-x^2}}{a+x+\sqrt{a^2-x^2}} = \frac{b}{x}$, $2a > b > 0$, $x \neq 0$

◀সম্মিত অধ্যায় ১১ ও ১৩

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা 1/ প্রশ্ন নং ৩]

দৃশ্যকল্প-২ : একটি গুণোত্তর ধারার ৩য় পদ $\frac{1}{\sqrt{3}}$ এবং ৮ম পদ $\frac{1}{27}$

ক. $3 + 6 + 9 + 12 + \dots$ ধারাটির প্রথম 20টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ২

খ. দৃশ্যকল্প-১ হতে x এর সকল সম্ভাব্য মান নির্ণয় কর। 8

গ. দৃশ্যকল্প-২ হতে গুণোত্তর ধারাটি নির্ণয় কর। 8

২৬ নং প্রশ্নের সমাধান

ক. সূজনশীল ১০(খ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

খ. $\frac{a+x-\sqrt{a^2-x^2}}{a+x+\sqrt{a^2-x^2}} = \frac{b}{x}$

বা, $\frac{a+x-\sqrt{a^2-x^2} + a+x+\sqrt{a^2-x^2}}{a+x-\sqrt{a^2-x^2} - a-x-\sqrt{a^2-x^2}} = \frac{b+x}{b-x}$

[যোজন-বিয়োজন করে]

বা, $\frac{2(a+x)}{-2\sqrt{a^2-x^2}} = \frac{b+x}{b-x}$

বা, $-\frac{a+x}{\sqrt{a^2-x^2}} = \frac{b+x}{b-x}$

বা, $\left(-\frac{a+x}{\sqrt{a^2-x^2}}\right)^2 = \left(\frac{b+x}{b-x}\right)^2$ [বর্গ করে]

বা, $\frac{(a+x)^2}{a^2-x^2} = \frac{(b+x)^2}{(b-x)^2}$

বা, $\frac{(a+x)(a+x)}{(a+x)(a-x)} = \frac{(b+x)^2}{(b-x)^2}$

বা, $\frac{a+x}{a-x} = \frac{(b+x)^2}{(b-x)^2}$

বা, $\frac{a+x+a-x}{a+x-a+x} = \frac{(b+x)^2 + (b-x)^2}{(b+x)^2 - (b-x)^2}$ [যোজন-বিয়োজন করে]

বা, $\frac{2a}{2x} = \frac{2(b^2+x^2)}{4b \cdot x}$ [অনুসিদ্ধান্ত ব্যবহার করে]

বা, $\frac{a}{x} = \frac{b^2+x^2}{2bx}$

বা, $\frac{a}{1} = \frac{b^2+x^2}{2b}$ [x দ্বারা গুণ করে $x \neq 0$]

$$\text{বা, } b^2 + x^2 = 2ab$$

$$\text{বা, } x^2 = 2ab - b^2$$

$$\therefore x = \pm \sqrt{2ab - b^2}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাধান, } x = \pm \sqrt{2ab - b^2}$$

গ সৃজনশীল ৯(খ)নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ২৭ একটি গুণোত্তর ধারার পঞ্চম পদ $\frac{2\sqrt{3}}{9}$ এবং দশম পদ $\frac{8\sqrt{2}}{81}$

[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা // প্রশ্ন নং ৩]

ক. উপরের তথ্যগুলো সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ কর। ২

খ. দেখাও যে, ধারাটির প্রথম পদ, $a = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ৪

গ. ধারাটি নির্ণয় করে প্রথম পাঁচটি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

$$\text{গুণোত্তর ধারার পঞ্চম পদ } \frac{2\sqrt{3}}{9} \text{ এবং দশম পদ } \frac{8\sqrt{2}}{81}$$

$$\text{ধরি, গুণোত্তর ধারার } 1\text{ম পদ} = a$$

$$\text{এবং সাধারণ অনুপাত} = r$$

$$\therefore \text{ধারাটির পঞ্চম পদ} = ar^{5-1}$$

$$\text{বা, } \frac{2\sqrt{3}}{9} = ar^4$$

$$\therefore ar^4 = \frac{2\sqrt{3}}{9} \dots \dots \dots (i)$$

$$\text{আবার, ধারাটির } 10\text{-তম পদ} = ar^{10-1}$$

$$\text{বা, } \frac{8\sqrt{2}}{81} = ar^9$$

$$\therefore ar^9 = \frac{8\sqrt{2}}{81} \dots \dots \dots (ii)$$

\therefore উদ্দীপকটি সমীকরণ (i) ও (ii) এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো। (Ans.)

খ সৃজনশীল ১৯(খ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

গ 'খ' হতে পাই,

$$1\text{ম পদ, } a = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ এবং সাধারণ অনুপাত, } r = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore \text{ধারাটি} = a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots \dots \dots$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^2 + \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^3 + \dots \dots \dots$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{2}}{3} + \dots \dots \dots \text{(Ans.)}$$

$$\therefore \text{ধারাটির প্রথম } 5\text{টি পদের সমষ্টি} = a \cdot \frac{1-r^5}{1-r} \quad [r < 1]$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^5}{1 - \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1 - \frac{4\sqrt{2}}{9\sqrt{3}}}{\frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{3}}}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{9\sqrt{3} - 4\sqrt{2}}{9\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{18} \times \frac{9\sqrt{3} - 4\sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{18} \times \frac{(9\sqrt{3} - 4\sqrt{2})(\sqrt{3} + \sqrt{2})}{(\sqrt{3} - \sqrt{2})(\sqrt{3} + \sqrt{2})}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{18} \times (9 \times 3 + 9\sqrt{6} - 4\sqrt{6} - 8)$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{18} \cdot (19 + 5\sqrt{6}) \text{(Ans.)}$$

প্রশ্ন ২৮ i. $5 + p + q + s + 3125$ গুণোত্তর ধারাভুক্ত।

ii. $3bm^2 - 4am + 3b = 0$

সমন্বিত অধ্যায় ১১ ও ১৩

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা // প্রশ্ন নং ৩]

ক. $7 + 10 + 13 + \dots$ ধারাটির কোন পদ 298? ২

খ. p, q, s এর মান নির্ণয় কর। ৪

গ. প্রমাণ কর যে, $\frac{\sqrt{2a+3b} + \sqrt{2a-3b}}{\sqrt{2a+3b} - \sqrt{2a-3b}} = m$ ৪

২৮ নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত ধারাটি $7 + 10 + 13 + \dots$

$$\text{এখানে সাধারণ অন্তর, } d = 10 - 7 = 13 - 10 = 3$$

$$\text{ধরি, } n\text{ তম পদ, } u_n = a + (n-1) \times d$$

$$\text{এখন, } a + (n-1) \times d = 298$$

$$\text{বা, } 7 + (n-1) \times 3 = 298$$

$$\text{বা, } n-1 = \frac{298-7}{3} = 97$$

$$\therefore n = 98$$

$$\therefore 98\text{ তম পদটি } 298$$

খ প্রদত্ত গুণোত্তর ধারাটি : $5 + p + q + s + 3125$

$$\text{এখানে, প্রথম পদ} = a, \text{ সাধারণ অনুপাত } r \text{ হলে,}$$

$$\text{পঞ্চম পদ } ar^4 = 3125$$

$$\text{বা, } 5 \times r^4 = 3125$$

$$\text{বা, } r^4 = 625 = (\pm 5)^4$$

$$\therefore r = \pm 5$$

$$\therefore 2\text{য় পদ, } p = ar = 5 \times (\pm 5) = \pm 25$$

$$3\text{য় পদ, } q = ar^2 = 5 \times (\pm 5)^2 = 125$$

$$8\text{র্থ পদ, } s = ar^3 = 5 \times (\pm 5)^3 = \pm 625$$

গ দেওয়া আছে, $3bm^2 - 4am + 3b = 0$

$$\text{বা, } 3b(m^2 + 1) = 4am$$

$$\text{বা, } \frac{m^2 + 1}{2m} = \frac{2a}{3b}$$

$$\text{বা, } \frac{m^2 + 1 + 2m}{m^2 + 1 - 2m} = \frac{2a + 3b}{2a - 3b} \quad [\text{যোজন-বিয়োজন করে পাই}]$$

$$\text{বা, } \frac{(m+1)^2}{(m-1)^2} = \frac{2a+3b}{2a-3b}$$

$$\text{বা, } \left(\frac{m+1}{m-1}\right)^2 = \frac{2a+3b}{2a-3b}$$

$$\text{বা, } \frac{m+1}{m-1} = \sqrt{\frac{2a+3b}{2a-3b}}$$

$$\text{বা, } \frac{m+1}{m-1} = \frac{\sqrt{2a+3b}}{\sqrt{2a-3b}}$$

$$\text{বা, } \frac{m+1+m-1}{m+1-m+1} = \frac{\sqrt{2a+3b} + \sqrt{2a-3b}}{\sqrt{2a+3b} - \sqrt{2a-3b}} \quad [\text{যোজন-বিয়োজন করে}]$$

$$\text{বা, } \frac{2m}{2} = \frac{\sqrt{2a+3b} + \sqrt{2a-3b}}{\sqrt{2a+3b} - \sqrt{2a-3b}}$$

$$\therefore m = \frac{\sqrt{2a+3b} + \sqrt{2a-3b}}{\sqrt{2a+3b} - \sqrt{2a-3b}} \text{(প্রমাণিত)}$$

প্রশ্ন ২৯ $33 + 29 + 25 + \dots - 19$ একটি ধারা এবং $m^2 - \frac{2m}{y} + 1 = 0$

সমন্বিত অধ্যায় ১১ ও ১৩

[ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা // প্রশ্ন নং ৩]

ক. ধারাটির 10 তম পদ কত? ২

খ. প্রমাণ কর যে, $m = \frac{\sqrt{1+y} + \sqrt{1-y}}{\sqrt{1+y} - \sqrt{1-y}}$ ৪

গ. ধারাটির 1ম পদকে 1ম পদ এবং সাধারণ অন্তরকে সাধারণ অনুপাত ধরে একটি গুণোত্তর ধারা গঠন কর এবং ধারাটির 1ম সাতটি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত ধারা, $33 + 29 + 25 + \dots - 19$

$$\text{এটি একটি সমান্তর ধারা।}$$

$$1\text{ম পদ, } a = 33$$

এবং সাধারণ অন্তর, $d = 29 - 33 = -4$

আমরা জানি, কোন সমান্তর ধারার n -তম পদ $= a + (n - 1)d$

$$\begin{aligned} \therefore \text{প্রদত্ত ধারার } 10\text{-তম পদ} &= 33 + (10 - 1)(-4) \\ &= 33 + 9(-4) \\ &= 33 - 36 \\ &= -3 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

খ অধ্যায়-১১ এর সৃজনশীল ১(গ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা-২৭৭

গ সৃজনশীল ১৬(গ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

অতঃপর, প্রান্ত গুণোত্তর ধারার ১ম সাতটি পদের সমষ্টি

$$\begin{aligned} S_7 &= \frac{33 \{1 - (-4)^7\}}{1 - (-4)} \left[\square S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}; \square r < 1 \right] \\ &= \frac{33(1 + 16384)}{1 + 4} \\ &= \frac{33 \times 16385}{5} \\ &= 33 \times 3277 \\ &= 108141 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

প্রশ্ন ৩০ a, b, c ক্রমিক সমানুপাতী এবং $2 + 4 + 8 + 16 + \dots$ একটি গুণোত্তর ধারা।

◀ সমন্বিত অধ্যায় ১১ ও ১৩

[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা // প্রশ্ন নং ৩]

- ক. গুণোত্তর ধারাটির কত তম পদ 128? ২
- খ. প্রমাণ কর যে, $a^3 b^2 c^2 \left(\frac{1}{a^3} + \frac{1}{b^3} + \frac{1}{c^3} \right) = a^3 + b^3 + c^3$ 8
- গ. ধারাটির n সংখ্যক পদের সমষ্টি 254 হলে n এর মান নির্ণয় কর। 8

৩০ নং প্রশ্নের সমাধান

ক ধারাটির প্রথম পদ, $a = 2$

সাধারণ অনুপাত, $r = \frac{4}{2} = 2$

ধরি, ধারাটির n তম পদ 128

$$\therefore ar^{n-1} = 128$$

$$\text{বা, } 2 \times 2^{n-1} = 128$$

$$\text{বা, } 2^n = 128$$

$$\text{বা, } 2^n = 2^7$$

$$\text{বা, } n = 7$$

$$\therefore n = 7$$

\therefore গুণোত্তর ধারাটির সপ্তম পদ 128

খ অধ্যায়-১১ এর সৃজনশীল ১১(খ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা-২৮১

গ গুণোত্তর ধারাটির,

প্রথম পদ, $a = 2$

সাধারণ অনুপাত, $r = \frac{4}{2} = 2 (> 1)$

n সংখ্যক পদের সমষ্টি $= 254$

$$\therefore \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} = 254$$

$$\text{বা, } \frac{2(2^n - 1)}{2 - 1} = 254$$

$$\text{বা, } 2(2^n - 1) = 254$$

$$\text{বা, } 2^n - 1 = 127$$

$$\text{বা, } 2^n = 128$$

$$\text{বা, } 2^n = 2^7$$

$$\therefore n = 7 \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন ৩১ কোন ধারার প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি এবং ঐ সংখ্যাগুলোর সমষ্টির অনুপাত 465 এবং অপর একটি গুণোত্তর ধারার তৃতীয় পদ $\frac{1}{\sqrt{3}}$

এবং দশম পদ $\frac{8\sqrt{2}}{81}$ । [গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা // প্রশ্ন নং ৩]

ক. $1 + 3 + 5 + 7 + \dots + n$ পদের সমষ্টি কত? ২

খ. n এর মান নির্ণয় কর। 8

গ. গুণোত্তর ধারাটির 12-তম পদ ও 20 পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। 8

৩১ নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত ধারাটি, $1 + 3 + 5 + 7 + \dots + n$

যার প্রথম পদ, $a = 1$ এবং সাধারণ অন্তর, $d = 3 - 1 = 2$

\therefore এটি একটি সমান্তর ধারা।

আমরা জানি, ধারাটির n পদের সমষ্টি,

$$\begin{aligned} S &= \frac{n}{2} \{2a + (n - 1)d\} \\ &= \frac{n}{2} \{2 \times 1 + (n - 1) \times 2\} \text{ [মান বসিয়ে]} \\ &= \frac{n}{2} (2 + 2n - 2) \\ &= \frac{n}{2} \times 2n \\ &= n^2 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

খ প্রশ্নমতে, $\frac{1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3}{1 + 2 + 3 + \dots + n} = 465 \dots \dots \dots$ (i)

আমরা জানি, $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$

$$\text{এবং } 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\text{সুতরাং } \frac{1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3}{1 + 2 + 3 + \dots + n} = \frac{\left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2}{\frac{n(n+1)}{2}} = \frac{n(n+1)}{2}$$

(i) নং সমীকরণ হতে পাই,

$$\frac{n(n+1)}{2} = 465$$

$$\text{বা, } n^2 + n = 930$$

$$\text{বা, } n^2 + n - 930 = 0$$

$$\text{বা, } n^2 + 31n - 30n - 930 = 0$$

$$\text{বা, } n(n + 31) - 30(n + 31) = 0$$

$$\text{বা, } (n - 30)(n + 31) = 0$$

$$\text{বা, } n - 30 = 0$$

$$\text{বা, } n = 30$$

অথবা, $n + 31 = 0$

$$\text{বা, } n = -31$$

এটি গ্রহণযোগ্য নয়।

$\therefore n = 30$ (Ans.)

গ ধরি, গুণোত্তর ধারার, ১ম পদ $= a$

সাধারণ অনুপাত $= r$

\therefore ধারাটির ৩য় পদ $= ar^{3-1} = ar^2$

$$১০ম পদ = ar^{10-1} = ar^9$$

প্রশ্নমতে, $ar^2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \dots \dots \dots$ (i)

$$ar^9 = \frac{8\sqrt{2}}{81} \dots \dots \dots$$
 (ii)

(ii) নং কে (i) নং দ্বারা ভাগ করে পাই,

$$\frac{ar^9}{ar^2} = \frac{\frac{8\sqrt{2}}{81}}{\frac{1}{\sqrt{3}}}$$

$$\text{বা, } r^7 = \frac{8\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}}{81}$$

$$= \frac{8\sqrt{2}}{27\sqrt{3}}$$

$$= \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \right)^7$$

$$\therefore r = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

r এর মান (i) নং এ বসিয়ে পাই,

$$a \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \right)^2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } a \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } a = \frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{3}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{ধারাটির 12 তম পদ} &= ar^{12-1} \\ &= ar^{11} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^{11} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^{10} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{32}{243} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \\ &= \frac{16\sqrt{2}}{243} \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{এবং প্রথম 20 পদের সমষ্টি, } S_{20} &= \frac{a(1-r^{20})}{1-r} \\ &= \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} \left\{ 1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^{20} \right\}}{1 - \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}} \\ &= \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} \left(1 - \frac{2^{10}}{3^{10}} \right)}{\frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{3}}} \\ &= \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{3^{10} - 2^{10}}{3^{10}}}{\frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{3}}} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{3^{10} - 2^{10}}{3^{10}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} \\ &= \frac{3 \times 58025}{2 \times 3^{10} \times (\sqrt{3} - \sqrt{2})} \\ &= \frac{58025}{2 \times 3^9 \times (\sqrt{3} - \sqrt{2})} \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

প্রশ্ন ৩২ কোনো সমান্তর ধারার দুইটি পদ, ℓ তম পদ ℓ^2 এবং k তম পদ k^2 এবং $5x + y + 40 + z$ গুণোত্তর ধারাত্ত্বক।

[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, ঢাকা ৷ প্রশ্ন নং ৩]

- ক. প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি 441 হলে, n -এর মান নির্ণয় কর। ২
- খ. সমান্তর ধারাটির $\ell + k - 1$ তম পদ নির্ণয় কর। 8
- গ. x, y, z এর মান নির্ণয় কর। 8

৩২ নং প্রশ্নের সমাধান

ক সৃজনশীল ১৮(গ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

খ ধরি, সমান্তর ধারাটির প্রথম পদ = a

এবং সাধারণ অন্তর = d

$$\therefore \text{ধারাটির } \ell \text{ তম পদ} = a + (\ell - 1)d$$

$$\text{এবং } k \text{ তম পদ} = a + (k - 1)d$$

$$\therefore \text{প্রশ্নমতে, } a + (\ell - 1)d = \ell^2 \dots \dots \dots \text{(i)}$$

$$a + (k - 1)d = k^2 \dots \dots \dots \text{(ii)}$$

(i) নং হতে (ii) নং বিয়োগ করে পাই,

$$\{a + (\ell - 1)d\} - \{a + (k - 1)d\} = \ell^2 - k^2$$

$$\text{বা, } a + (\ell - 1)d - a - (k - 1)d = \ell^2 - k^2$$

$$\text{বা, } d(\ell - 1 - k + 1) = \ell^2 - k^2$$

$$\text{বা, } d(\ell - k) = (\ell + k)(\ell - k)$$

$$\therefore d = \ell + k \dots \dots \dots \text{(iii)}$$

$$\therefore \text{ধারাটির } (\ell + k - 1) \text{ তম পদ} = a + \{(\ell + k - 1) - 1\}d$$

$$= a + \{(\ell - 1) + (k - 1)\}d$$

$$= a + (\ell - 1)d + (k - 1)d$$

$$= \ell^2 + (k - 1)(\ell + k)$$

[(i) ও (iii) হতে মান বসিয়ে]

$$= \ell^2 + k\ell + k^2 - \ell - k$$

$$= \ell^2 + k^2 + k\ell - \ell - k \text{ (Ans.)}$$

গ এখানে, প্রথম পদ, $a = 5$

চতুর্থ পদ = 40

বা, $ar^{4-1} = 40$ [যেখানে, $r =$ সাধারণ অনুপাত]

$$\text{বা, } 5r^3 = 40$$

$$\text{বা, } r^3 = 8$$

$$\therefore r = 2$$

$$\therefore x = \text{দ্বিতীয় পদ} = ar^{2-1} = ar$$

$$= 5.2 = 10$$

$$y = \text{তৃতীয় পদ} = ar^{3-1} = ar^2$$

$$= 5.2^2 = 20$$

$$z = \text{পঞ্চম পদ} = ar^{5-1}$$

$$= ar^4$$

$$= 5.2^4 = 80$$

$$\therefore x = 10, y = 20, z = 80 \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন ৩৩ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টি 7। সংখ্যাটির অঙ্কদ্বয় স্থান বিনিময় করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তা প্রদত্ত সংখ্যা হতে 27 বেশি।

◀সমন্বিত অধ্যায় ১২ ও ১৩

[শহীদ বীর উত্তম লেঃ আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা ৷ প্রশ্ন নং ৩]

- ক. সংখ্যাটির একক স্থানীয় অঙ্ক x এবং দশক স্থানীয় অঙ্ক y ধরে সমীকরণ জোট গঠন কর। ২
- খ. সংখ্যাটি নির্ণয় কর। 8
- গ. সংখ্যাটির একক স্থানীয় অঙ্ক ও দশক স্থানীয় অঙ্ক যথাক্রমে একটি সমান্তর ধারার প্রথম পদ ও সাধারণ অন্তর হলে ধারাটির 15 তম পদ এবং ১ম 20 পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। 8

৩৩ নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, নির্ণেয় সংখ্যাটির একক স্থানীয় অঙ্ক x এবং দশক স্থানীয় অঙ্কটি y ।

$$\therefore x + y = 7 \dots \dots \dots \text{(i)}$$

$$\therefore \text{সংখ্যাটি} = 10y + x$$

$$\text{শর্তমতে, } 10y + x + 27 = 10x + y \dots \dots \dots \text{(ii)}$$

খ (i) নং হতে পাই,

$$x = 7 - y \dots \dots \dots \text{(iii)}$$

(ii) নং হতে পাই,

$$10y + 7 - y + 27 = 10(7 - y) + y$$

$$\text{বা, } 9y + 34 = 70 - 10y + y$$

$$\text{বা, } 18y = 36$$

$$\text{বা, } y = 2$$

$$\text{(iii) হতে পাই, } x = 7 - 2 = 5$$

$$\therefore \text{সংখ্যাটি } 10 \times 2 + 5 = 25 \text{ (Ans.)}$$

গ প্রথম পদ, $a = 5$ এবং সাধারণ অন্তর, $d = 2$

$$\therefore \text{ধারাটির } n \text{ তম পদ} = a + (n - 1)d$$

$$\therefore 15 \text{ তম পদ} = 5 + (15 - 1) \times 2$$

$$= 33 \text{ (Ans.)}$$

\therefore ধারাটির প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি

$$= \frac{n}{2} \{ 2a + (n - 1)d \}$$

\therefore ধারাটির প্রথম 20 টি পদের সমষ্টি

$$= \frac{20}{2} \{ 2 \times 5 + (20 - 1) \times 2 \}$$

$$= 10 \{ 10 + 19.2 \}$$

$$= 10 \{ 10 + 38 \}$$

$$= 10 \times 48 = 480 \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন ৩৪ একটি গুণোত্তর ধারার 8র্থ পদ $\frac{1}{3}$ এবং দশম পদ $\frac{1}{81}$ এবং অপর একটি সমান্তর ধারার প্রথম 12 পদের সমষ্টি 222 এবং প্রথম 24 পদের সমষ্টি 876।

[মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা ৷ প্রশ্ন নং ৩]

- ক. $3 + 5 + 7 + 9 + \dots$ ধারার কোন পদ 303? ২
- খ. গুণোত্তর ধারাটি নির্ণয় কর। 8
- গ. সমান্তর ধারাটির 60 তম পদ নির্ণয় কর। 8

৩৪ নং প্রশ্নের সমাধান

সৃজনশীল ৫নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ $x^2 = 5 + 2\sqrt{6}$ এবং $\frac{14}{y} = \frac{1}{m} + \frac{1}{n}$

◀ সমন্বিত অধ্যায় ৩, ১১ ও ১৩

[মতিঝিল সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা // প্রশ্ন নং ২]

- ক. $64 + 32 + 16 + \dots$ ধারাটির অষ্টম পদ কত? ২
- খ. $x^5 - \frac{1}{x^3}$ এর মান নির্ণয় কর। ৪
- গ. প্রমাণ কর যে, $\frac{y+7m}{y-7m} + \frac{y+7n}{y-7n} = 2$ ৪

৩৫ নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত ধারাটি $64 + 32 + 16 + \dots$

যার প্রথম পদ, $a = 64$

সাধারণ অনুপাত, $r = \frac{32}{64} = \frac{16}{32} = \frac{1}{2}$

∴ এটি একটি গুণোত্তর ধারা।

আমরা জানি, গুণোত্তর ধারার n তম পদ $= ar^{n-1}$

∴ ধারাটির ৪ম পদ $= 64 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{8-1}$
 $= 64 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^7 = 64 \cdot \frac{1}{128} = \frac{1}{2}$ (Ans)

খ দেওয়া আছে,

$x^2 = 5 + 2\sqrt{6}$
 $= 3 + 2\sqrt{3 \cdot 2} + 2$
 $= (\sqrt{3})^2 + 2\sqrt{3 \cdot 2} + (\sqrt{2})^2$
 $= (\sqrt{3} + \sqrt{2})^2$

∴ $x = \sqrt{3} + \sqrt{2}$

∴ $\frac{1}{x} = \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$
 $= \frac{1 \times (\sqrt{3} - \sqrt{2})}{(\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2})^2}$
 $= \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{3 - 2}$
 $= \sqrt{3} - \sqrt{2}$

∴ $x + \frac{1}{x} = \sqrt{3} + \sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{2} = 2\sqrt{3}$

এবং $x - \frac{1}{x} = \sqrt{3} + \sqrt{2} - \sqrt{3} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$

এখন, $x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2x \cdot \frac{1}{x}$
 $= (2\sqrt{2})^2 + 2$
 $= 8 + 2 = 10$

∴ $x^2 + \frac{1}{x^2} = 10 \dots \dots$ (i)

$x^3 - \frac{1}{x^3} = \left(x - \frac{1}{x}\right)^3 + 3 \cdot x \cdot \frac{1}{x} \left(x - \frac{1}{x}\right)$
 $= (2\sqrt{2})^3 + 3 \cdot 2\sqrt{2}$ [মান বসিয়ে]
 $= 16\sqrt{2} + 6\sqrt{2} = 22\sqrt{2} \dots \dots$ (ii)

(i) ও (ii) গুণ করে পাই,

$\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) \left(x^3 - \frac{1}{x^3}\right) = 10 \times 22\sqrt{2}$

বা, $x^5 + x - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^5} = 220\sqrt{2}$

বা, $x^5 - \frac{1}{x^5} = 220\sqrt{2} - \left(x - \frac{1}{x}\right) = 220\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = 218\sqrt{2}$ (Ans.)

গ দেওয়া আছে, $\frac{14}{y} = \frac{1}{m} + \frac{1}{n}$

বা, $\frac{14}{y} = \frac{m+n}{mn}$

বা, $y = \frac{14mn}{m+n}$

বা, $\frac{y}{7m} = \frac{2n}{m+n}$

বা, $\frac{y+7m}{y-7m} = \frac{2n+m+n}{2n-m-n}$ [যোজন-বিয়োজন করে]

বা, $\frac{y+7m}{y-7m} = \frac{3n+m}{n-m} \dots \dots \dots$ (i)

আবার, $y = \frac{14mn}{m+n}$

বা, $\frac{y}{7n} = \frac{2m}{m+n}$

বা, $\frac{y+7n}{y-7n} = \frac{2m+m+n}{2m-m-n}$ [যোজন-বিয়োজন করে]

বা, $\frac{y+7n}{y-7n} = \frac{3m+n}{m-n} \dots \dots \dots$ (ii)

(i) ও (ii) নং যোগ করে পাই,

$\frac{y+7m}{y-7m} + \frac{y+7n}{y-7n} = \frac{3n+m}{n-m} + \frac{3m+n}{m-n}$
 $= \frac{3m+n}{m-n} - \frac{m+3n}{m-n}$
 $= \frac{3m+n-m-3n}{m-n}$
 $= \frac{2m-2n}{m-n}$
 $= \frac{2(m-n)}{m-n}$
 $= 2$ (Ans.)

প্রশ্ন ▶ ৩৬ (i) একটি সমান্তর ধারার ১ম 12 পদের সমষ্টি 144, ১ম 20 পদের সমষ্টি 560 এবং (ii) $2 - 4 + 8 - 16 + \dots \dots + 128$ একটি ধারা।

[উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা // প্রশ্ন নং ৩]

- ক. একটি অনুক্রমের সাধারণ পদ $(-1)^{n-1} \frac{n}{2n+1}$ হলে, অনুক্রমটির প্রথম 5টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ২
- খ. (i) নং ধারাটির ১ম 6 পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪
- গ. (ii) নং ধারাটির সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

অনুক্রমটির সাধারণ পদ, $(-1)^{n-1} \frac{n}{2n+1}$

∴ অনুক্রমটির ১ম ($n=1$) পদ $= (-1)^{1-1} \times \frac{1}{2 \cdot 1 + 1} = \frac{1}{3}$

তদ্রূপ ২য় ($n=2$) পদ $= -\frac{2}{5}$

৩য় পদ $= \frac{3}{7}$

৪র্থ পদ $= -\frac{4}{9}$

৫ম পদ $= \frac{5}{11}$

∴ নির্ণেয় সমষ্টি $= \frac{1}{3} - \frac{2}{5} + \frac{3}{7} - \frac{4}{9} + \frac{5}{11}$
 $= \frac{1155 - 1386 + 1485 - 1540 + 1575}{3465}$
 $= \frac{1289}{3465}$ (Ans.)

খ মনে করি, সমান্তর ধারাটির প্রথম পদ $= a$

ও সাধারণ অন্তর $= d$

আমরা জানি, কোন সমান্তর ধারার প্রথম n পদের

সমষ্টি, $S_n = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\}$

∴ সমান্তর ধারাটির প্রথম 12 পদের

সমষ্টি, $S_{12} = \frac{12}{2} \{2a + (12-1)d\}$

বা, $144 = 6(2a + 11d)$ [$S_{12} = 144$]

বা, $24 = 2a + 11d$

∴ $2a + 11d = 24 \dots \dots$ (i)

আবার, সমান্তর ধারাটির প্রথম 20 পদের সমষ্টি,

$$S_{20} = \frac{20}{2} \{2a + (20 - 1)d\}$$

$$\text{বা, } 560 = 10(2a + 19d) \quad [S_{20} = 560]$$

$$\text{বা, } 56 = 2a + 19d$$

$$\therefore 2a + 19d = 56 \dots \dots (ii)$$

(ii) নং থেকে (i) নং বিয়োগ করি,

$$2a + 19d = 56 \dots \dots (ii)$$

$$2a + 11d = 24 \dots \dots (i)$$

$$\begin{array}{r} (-) \quad (-) \quad (-) \\ 8d = 32 \quad [\text{বিয়োগ করে}] \end{array}$$

$$\therefore d = 4$$

d এর মান (i) নং এ বসিয়ে পাই,

$$2a + 11.4 = 24$$

$$\text{বা, } 2a + 44 = 24$$

$$\text{বা, } 2a = 24 - 44$$

$$\text{বা, } 2a = -20$$

$$\therefore a = -10$$

\therefore সমান্তর ধারার প্রথম 6 পদের

$$\text{সমষ্টি, } S_6 = \frac{6}{2} \{2(-10) + (6 - 1)4\} \quad [\text{মান বসিয়ে}]$$

$$= 3\{-20 + 5.4\} = 3(-20 + 20) = 3.0 = 0$$

Ans. 0

গ প্রদত্ত ধারা = 2 - 4 + 8 - + 128

ধারাটির 1ম পদ, a = 2

$$\text{সাধারণ অনুপাত, } r = \frac{-4}{2} = -2, r < 1$$

মনে করি, n তম পদ = 128

$$\text{বা, } 2(-2)^{n-1} = 128$$

$$\text{বা, } (-2)^{n-1} = 64$$

$$\text{বা, } (-2)^{n-1} = (-2)^6$$

$$\text{বা, } n - 1 = 6$$

$$\therefore n = 7$$

$$\begin{aligned} \text{প্রদত্ত ধারার 1ম 7 পদের সমষ্টি} &= \frac{2[1 - (-2)^7]}{1 - (-2)} \\ &= \frac{2(1 + 128)}{3} = 86 \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

প্রশ্ন 39 একটি সমান্তর ধারার p-তম পদ p^2 এবং q-তম পদ q^2 . একটি গুণোত্তর ধারার অষ্টম পদ - 27 এবং একাদশ পদ $81\sqrt{3}$.

[মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা // প্রশ্ন নং 2]

ক. $128 + 64 + 32 + \dots$ ধারাটির কোন পদ $\frac{1}{2}$? 2

খ. সমান্তর ধারাটির p + q - 1 তম পদ নির্ণয় কর। 8

গ. গুণোত্তর ধারাটির পঞ্চম পদ নির্ণয় কর। 8

39 নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত ধারাটির প্রথম পদ, a = 128

$$\text{সাধারণ অনুপাত, } r = \frac{64}{128} = \frac{32}{64} = \frac{1}{2}$$

\therefore ইহা একটি গুণোত্তর ধারা।

মনে করি, ধারাটির n তম পদ = $\frac{1}{2}$

$$\text{আমরা জানি, } n \text{ তম পদ} = ar^{n-1}$$

$$\therefore 128 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{2}$$

$$\text{বা, } \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{2.128}$$

$$\text{বা, } \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{256}$$

$$\text{বা, } \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^8$$

$$\text{বা, } n - 1 = 8$$

$$\text{বা, } n = 8 + 1$$

$$\therefore n = 9$$

$$\therefore \text{ধারাটির 9ম পদ} = \frac{1}{2} \quad (\text{Ans.})$$

খ সূত্রনশীল 32(খ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

গ সূত্রনশীল 23(গ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

অতঃপর, গুণোত্তর ধারাটির পঞ্চম পদ = ar^{5-1}

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot (-\sqrt{3})^4 \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot 9 = 3\sqrt{3} \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

প্রশ্ন 38 একটি গুণোত্তর ধারার অষ্টম পদ - 27 এবং একাদশ পদ $81\sqrt{3}$

[উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা // প্রশ্ন নং 3]

ক. অনুক্রম এবং সমান্তর ধারার মধ্যে দুটি করে পার্থক্য লেখ। 2

খ. ধারাটির 14 তম পদ নির্ণয় কর। 8

গ. ধারাটির প্রথম দশটি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। 8

38 নং প্রশ্নের সমাধান

ক

সমান্তর ধারা	অনুক্রম
(i) কোনো ধারার যেকোনো পদ ও তার পূর্ববর্তী পদের পার্থক্য সব সময় সমান হলে সেই ধারাটিকে সমান্তর ধারা বলে।	(i) যদি কতগুলো রাশিকে একটা বিশেষ নিয়মে ক্রমান্বয়ে এমনভাবে সাজানো হয় যে প্রত্যেক রাশি তার পূর্বের পদ ও পরের পদের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত তা জানা যায়। তাহলে, এভাবে সাজানো রাশিগুলোর সেটকে অনুক্রম বলে।
(ii) উদাহরণ: $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1)$	(ii) উদাহরণ: $1, 3, 5, \dots (2n - 1) \dots$

খ 'ক' হতে পাই,

$$ar^7 = -27 \dots \dots \dots (i)$$

$$ar^{10} = 81\sqrt{3} \dots \dots \dots (ii)$$

সমীকরণ (ii) কে (i) দ্বারা ভাগ করে পাই,

$$\frac{ar^{10}}{ar^7} = \frac{81\sqrt{3}}{-27}$$

$$\text{বা, } r^3 = -3\sqrt{3}$$

$$\text{বা, } r^3 = (-\sqrt{3})^3$$

$$\therefore r = -\sqrt{3}$$

r এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$a \cdot (-\sqrt{3})^7 = -27$$

$$\text{বা, } a(-27\sqrt{3}) = -27$$

$$\text{বা, } a = \frac{-27}{-27\sqrt{3}}$$

$$\therefore a = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore \text{ধারাটির 14তম পদ} = \frac{1}{\sqrt{3}} (-\sqrt{3})^{14-1}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} (-\sqrt{3})^{13}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot (-729\sqrt{3})$$

$$= -729 \quad (\text{Ans.})$$

গ সূত্রনশীল 23(গ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন 39 $24 + x + y + 3 + \dots$ একটি ধারা।

[বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল // প্রশ্ন নং 3]

ক. প্রথম 10টি স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি নির্ণয় কর। 2

খ. ধারাটি সমান্তর এবং n তম পদ - 39 হলে, n এর মান নির্ণয় কর। 8

গ. ধারাটি গুণোত্তর হলে, প্রথম 7টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। 8

39 নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি = $\left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$

∴ প্রথম দশটি (n = 10) স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি = $\left\{ \frac{10(10+1)}{2} \right\}^2 =$

$\left(\frac{10 \times 11}{2} \right)^2 = 55^2 = 3025$ (Ans.)

খ সমান্তর ধারাটি, $24 + x + y + 3 + \dots$

প্রথম পদ, $a = 24$

∴ n-তম পদ = $a + (n - 1) \times d$

∴ চতুর্থ পদ = $24 + (4 - 1) \times d$

বা, $3 = 24 + 3d$

বা, $3d = -24 + 3$

∴ $d = -7$

প্রশ্নমতে, n তম পদ = -39

বা, $a + (n - 1)d = -39$

বা, $24 + (n - 1) \times (-7) = -39$

বা, $24 - 7n + 7 = -39$

বা, $-7n = -39 - 24 - 7$

বা, $-7n = -70$

∴ $n = 10$ (Ans.)

গ গুণোত্তর ধারাটি, $24 + x + y + 3 + \dots$

∴ n তম পদ = ar^{n-1}

অর্থাৎ, চতুর্থ পদ = $ar^{4-1} = ar^3$

বা, $3 = 24 \times r^3$

বা, $r^3 = \frac{1}{8}$

বা, $r^3 = \left(\frac{1}{2} \right)^3$

∴ $r = \frac{1}{2} < 1$

আবার, ধারাটির প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি S_n হলে,

$S_n = a \frac{1-r^n}{1-r}$, [$r < 1$]

∴ $S_7 = 24 \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^7}{1 - \frac{1}{2}}$
 $= 24 \times \frac{128-1}{128} \times 2$
 $= \frac{24 \times 127}{64}$
 $= \frac{381}{8}$ (Ans.)

প্রশ্ন 80 (i) কোনো সমান্তর ধারার m তম পদ n এবং n তম পদ m.

(ii) $\frac{1}{\sqrt{2}}, -1, \sqrt{2}, \dots$

[সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর ৷ প্রশ্ন নং ৩]

- ক. প্রথম 99টি স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল নির্ণয় কর। 2
 খ. (ii) অনুক্রমটির কোন পদ $8\sqrt{2}$? 8
 গ. (i) ধারাটির প্রথম $(m + n - 1)$ তম পদ কত? 8

80 নং প্রশ্নের সমাধান

ক পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনী-১৩.১ এর উদাহরণ-৪ দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা- ২৫৩

খ সৃজনশীল ১৪(খ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

গ মনে করি, সমান্তর ধারাটির প্রথম পদ = a

এবং সাধারণ অন্তর = d

∴ ধারাটির m তম পদ = $a + (m - 1)d$

এবং n তম পদ = $a + (n - 1)d$

প্রশ্নমতে, $a + (m - 1)d = n \dots$ (i)

$a + (n - 1)d = m \dots$ (ii)

(i) নং হতে (ii) নং বিয়োগ করে পাই,

$\{a + (m - 1)d\} - \{a + (n - 1)d\} = n - m$

বা, $a + (m - 1)d - a - (n - 1)d = n - m$

বা, $d \{(m - 1) - (n - 1)\} = n - m$

বা, $d (m - 1 - n + 1) = n - m$

বা, $d (m - n) = n - m$

বা, $-d (n - m) = n - m$

বা, $d = \frac{(n - m)}{-(n - m)}$

∴ $d = -1$

∴ $(m + n - 1)$ তম পদ = $a + (m + n - 1 - 1)d$

= $a + (m - 1)d + (n - 1)d$

= $n + (n - 1)(-1)$ [i নং থেকে]

= $n - n + 1$

= 1 (Ans.)

প্রশ্ন 81 একটি গুণোত্তর ধারার ৪র্থ পদ $\frac{1}{3}$ এবং দশম পদ $\frac{1}{81}$ এবং অপর সমান্তর

ধারার ১ম 12 পদের সমষ্টি 222 এবং ১ম 24 পদের সমষ্টি 876.

[জামালপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, জামালপুর ৷ প্রশ্ন নং ৩]

- ক. $3 + 5 + 7 + 9 + \dots$ ধারার কোন পদ 303? 2
 খ. গুণোত্তর ধারাটি নির্ণয় কর। 8
 গ. সমান্তর ধারাটির 60 তম পদ নির্ণয় কর। 8

81 নং প্রশ্নের সমাধান

সৃজনশীল ৫ নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন 82 একটি গুণোত্তর ধারার ১ম পদ a এবং সাধারণ অনুপাত r ধারাটির তৃতীয়

পদ $\frac{1}{3\sqrt{3}}$ এবং ৬ষ্ঠ পদ $\frac{2\sqrt{2}}{27}$ ।

[শেরপুর সরকারি ভিক্টোরিয়া একাডেমী, শেরপুর ৷ প্রশ্ন নং ৩]

- ক. উদ্দীপকের আলোকে দুইটি সমীকরণ গঠন কর। 2
 খ. ধারাটির অষ্টম পদ নির্ণয় কর। 8
 গ. ধারাটি নির্ণয় কর এবং ১ম 12টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। 8

82 নং প্রশ্নের সমাধান

ক গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ a, এবং সাধারণ অনুপাত r হলে,

তৃতীয় পদ = ar^{3-1}

ষষ্ঠ পদ = ar^{6-1}

শর্তমতে, $ar^{3-1} = \frac{1}{3\sqrt{3}}$

বা, $ar^2 = \frac{1}{3\sqrt{3}} \dots \dots$ (i)

এবং $ar^{6-1} = \frac{2\sqrt{2}}{27}$

বা, $ar^5 = \frac{2\sqrt{2}}{27} \dots \dots$ (ii)

খ 'ক' এর সমীকরণ (ii) ÷ (i) করে পাই,

$\frac{ar^5}{ar^2} = \frac{2\sqrt{2}}{27} \times 3\sqrt{3}$

বা, $r^3 = \frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{3}}$

বা, $r^3 = \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \right)^3$

∴ $r = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

(i) নং এ $r = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ বসিয়ে পাই,

$a \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \right)^2 = \frac{1}{3\sqrt{3}}$

বা, $a = \frac{1}{3\sqrt{3}} \times \frac{3}{2} = \frac{1}{2\sqrt{3}}$

∴ ধারাটির অষ্টম পদ = ar^{8-1}

$$= \frac{1}{2\sqrt{3}} \times \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^7 \text{ [a ও r এর মান বসিয়ে]}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{3}} \times \frac{2^3 \cdot \sqrt{2}}{3^3 \cdot \sqrt{3}}$$

$$= \frac{4\sqrt{2}}{81} \text{ (Ans.)}$$

গ 'খ' হতে পাই, ধারাটির প্রথম পদ, $a = \frac{1}{2\sqrt{3}}$

$$\text{এবং সাধারণ অনুপাত } r = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore \text{ ধারাটি, } \frac{1}{2\sqrt{3}} + \frac{1}{2\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} + \frac{1}{2\sqrt{3}} \times \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^2 + \dots$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{2}}{6} + \frac{1}{3\sqrt{3}} + \dots$$

$$\text{ধারাটির প্রথম 12টি পদের সমষ্টি} = \frac{a(1-r^n)}{1-r} \text{ [} \square r < 1 \text{]}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{3}} \left\{ 1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^{12} \right\}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{3}} \left(1 - \frac{2^6}{3^6} \right)$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{3}} \frac{(3^6 - 2^6)}{3^6}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{(3^6 - 2^6)}{\sqrt{3} \cdot 3^6}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{665}{729}$$

$$= \frac{665}{1458} (\sqrt{3} + \sqrt{2}) \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন 8৩ একটি গুণোত্তর ধারার পঞ্চম পদ $\frac{2\sqrt{3}}{9}$ এবং দশম পদ $\frac{8\sqrt{2}}{81}$ ।

[ফরিদপুর জিলা স্কুল, ফরিদপুর ৷ প্রশ্ন নং ৩]

- ক. গুণোত্তর ধারা কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখ। ২
- খ. ধারাটির চতুর্থ পদ নির্ণয় কর। ৪
- গ. সম্পূর্ণ ধারাটি নির্ণয় কর। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের সমাধান

ক গুণোত্তর ধারা: কোনো ধারার যেকোনো পদ ও এর পূর্ববর্তী পদের অনুপাত সব সময় সমান হলে অর্থাৎ যেকোনো পদকে এর পূর্ববর্তী পদ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল সর্বদা সমান পাওয়া গেলে সে ধারাটিকে গুণোত্তর ধারা বলে। যেমন: 2 + 4 + 8 + 16 + ...

খ সৃজনশীল ১৯(খ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

গ 'খ' হতে পাই, ১ম পদ, $a = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\text{সাধারণ অনুপাত, } r = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

$$\text{সুতরাং, ২য় পদ} = ar^{2-1} = ar$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{৩য় পদ} = ar^{3-1} = ar^2$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^2$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{2}{3}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{৪র্থ পদ} = \frac{\sqrt{2}}{3} \text{ ['খ' হতে পাই]}$$

$$\text{৫ম পদ} = \frac{2\sqrt{3}}{9} \text{ [দেওয়া আছে]}$$

$$\text{৬ষ্ঠ পদ} = ar^{6-1}$$

$$= ar^5$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^5$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{4\sqrt{2}}{9\sqrt{3}}$$

$$= \frac{2\sqrt{2}}{9}$$

$$\text{৭ম পদ} = ar^{7-1}$$

$$= ar^6$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^6$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{8}{27}$$

$$= \frac{4\sqrt{3}}{27}$$

$$\text{৮ম পদ} = ar^{8-1}$$

$$= ar^7$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^7$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{8\sqrt{2}}{27\sqrt{3}}$$

$$= \frac{4\sqrt{2}}{27}$$

$$\text{৯ম পদ} = ar^{9-1}$$

$$= ar^8$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^8$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{16}{81}$$

$$= \frac{8\sqrt{3}}{81}$$

$$\text{সুতরাং ধারাটি, } \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{2}}{3} + \frac{2\sqrt{3}}{9} + \frac{2\sqrt{2}}{9} + \frac{4\sqrt{3}}{27} + \frac{4\sqrt{2}}{27} + \frac{8\sqrt{3}}{81} +$$

$$\frac{8\sqrt{2}}{81} \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন 88 $\frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{8} - \frac{1}{16} + \dots$ একটি ধারা।

[রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হেলেনাবাদ, রাজশাহী ৷ প্রশ্ন নং ২]

- ক. ধারাটির দশম পদ বের কর। ২
- খ. ধারাটির কোন পদ $-\frac{1}{2^{10}}$? ৪
- গ. ধারাটির প্রথম আটটি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের সমাধান

ক ধারাটির প্রথম পদ, $a = \frac{1}{2}$

$$\text{সাধারণ অনুপাত, } r = \frac{-\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore \text{ ধারাটির } n \text{ তম পদ} = ar^{n-1}$$

$$\therefore \text{ ধারাটির দশম পদ} = \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^{10-1}$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{-1}{2}\right)^9$$

$$= -\frac{1}{2^{10}} \text{ (Ans.)}$$

খ 'ক' হতে পাই,

ধারাটির দশম পদ $-\frac{1}{2^{10}}$ (Ans.)

গ 'ক' হতে পাই,

প্রথম পদ, $a = \frac{1}{2}$

সাধারণ অনুপাত, $r = -\frac{1}{2} < 1$

আমরা জানি,

গুণোত্তর ধারার প্রথম n পদের

সমষ্টি, $S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$ [$r < 1$]

∴ ধারাটির প্রথম আট পদের সমষ্টি,

$$S_8 = \frac{\frac{1}{2} \left\{ 1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^8 \right\}}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2^8}\right)}{1 + \frac{1}{2}}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{256-1}{256}\right)}{\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{255}{256} \times \frac{2}{3}$$

$$= \frac{85}{256} \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন 8৫ কোনো গুণোত্তর ধারার তৃতীয় পদ $\frac{1}{3\sqrt{3}}$ এবং পঞ্চম পদ $\frac{1}{9\sqrt{3}}$

[রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল, রাজশাহী ৷ প্রশ্ন নং ৩]

ক. $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 75 =$ কত? ২

খ. উদ্দীপকের আলোকে দেখাও যে, ধারাটির প্রথম পদ = সাধারণ অনুপাত। ৪

গ. একটি সমান্তর ধারার p তম, q তম এবং r তম পদ যথাক্রমে x, y, z হলে, প্রমাণ কর যে, $x(q-r) + y(r-p) + z(p-q) = 0$. ৪

৪৫ নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি $= \frac{n(n+1)}{2}$
 ∴ প্রথম 75 টি স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি $= \frac{75(75+1)}{2}$
 $= \frac{75 \times 76}{2}$
 $= 2850$ (Ans.)

খ ধরি, ধারাটির প্রথম পদ $= a$

সাধারণ অনুপাত $= r$

আমরা জানি, গুণোত্তর ধারার n -তম পদ $= ar^{n-1}$

প্রশ্নমতে, $ar^{3-1} = \frac{1}{3\sqrt{3}}$

∴ $ar^2 = \frac{1}{3\sqrt{3}}$ (i)

আবার, $ar^{5-1} = \frac{1}{9\sqrt{3}}$

∴ $ar^4 = \frac{1}{9\sqrt{3}}$ (ii)

এখন, (ii) ÷ (i) করে পাই, $\frac{ar^4}{ar^2} = \frac{\frac{1}{9\sqrt{3}}}{\frac{1}{3\sqrt{3}}}$

বা, $r^2 = \frac{1}{9\sqrt{3}} \times 3\sqrt{3}$

বা, $r^2 = \frac{1}{3}$

∴ $r = \frac{1}{\sqrt{3}}$ [ধন্বক মান নিয়ে]

r এর মান (i)-এ বসিয়ে পাই,

$a \times \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{1}{3\sqrt{3}}$

বা, $\frac{a}{3} = \frac{1}{3\sqrt{3}}$

∴ $a = \frac{1}{\sqrt{3}} = r$

∴ ধারাটির প্রথম পদ = সাধারণ অনুপাত। (দেখানো হলো)

গ মনে করি,

সমান্তর ধারার প্রথম পদ $= m$ ও সাধারণ অন্তর $= d$

আমরা জানি,

সমান্তর ধারার প্রথম n তম পদ $= m + (n-1)d$

∴ সমান্তর ধারার প্রথম p তম পদ $= m + (p-1)d = x \dots$ (i)

ও q তম পদ $= m + (q-1)d = y \dots$ (ii)

এবং r তম পদ $= m + (r-1)d = z \dots$ (iii)

বামপক্ষ $= x(q-r) + y(r-p) + z(p-q)$

$= \{m + (p-1)d\}(q-r) + \{m + (q-1)d\}(r-p) +$

$\{m + (r-1)d\}(p-q)$ [x, y, z এর মান বসিয়ে]

$= m(q-r) + d(p-1)(q-r) + m(r-p) + d(q-1)(r-p) +$

$+ m(p-q) + d(r-1)(p-q)$

$= m(q-r+r-p+p-q) + d(pq-pr-q+r+qr-pq-r+p+pr-qr-p+q)$

$= m \times 0 + d \times 0 = 0 + 0 = 0$

$=$ ডানপক্ষ

∴ $x(q-r) + y(r-p) + z(p-q) = 0$ (প্রমাণিত)

প্রশ্ন 8৬ একটি সমান্তর ধারার r তম পদ m^2 ও m তম পদ r^2 ; অপর একটি ধারা $1 +$

$\frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots$

[নওগাঁ কে.ডি. সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নওগাঁ ৷ প্রশ্ন নং ২]

ক. ১ম ধারাকে 2টি সমীকরণ আকারে প্রকাশ কর। ২

খ. $(r+m+1)$ তম পদ নির্ণয় কর। ৪

গ. ২য় ধারাটির প্রথম 7টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের সমাধান

ক ধরি, সমান্তর ধারার প্রথম পদ a এবং সাধারণ অন্তর d .

আমরা জানি,

সমান্তর ধারার r তম পদ $= a + (r-1)d$

এবং m তম পদ $= a + (m-1)d$

প্রশ্নমতে, $a + (r-1)d = m^2 \dots$ (i)

$a + (m-1)d = r^2 \dots$ (ii) (Ans.)

খ (i) নং থেকে (ii) নং বিয়োগ করে

$a + (r-1)d - a - (m-1)d = m^2 - r^2$

বা, $d(r-1-m+1) = m^2 - r^2$

বা, $d(r-m) = (m+r)(m-r)$

বা, $d = \frac{-(m+r)(r-m)}{(r-m)}$

∴ $d = -(m+r)$

∴ $(r+m+1)$ তম পদ

$= a + \{(r+m+1) - 1\}d$

$$\begin{aligned}
&= a + \{(r-1) + (m+1)\}d \\
&= a + (r-1)d + d(m+1) \\
&= m^2 + \{-(m+r)\}(m+1) \\
&= m^2 - (m+r)(m+1) \\
&= m^2 - \{m^2 + m + r + mr\} \\
&= m^2 - m^2 - m - r - mr \\
&= -(m+r+mr) \text{ (Ans.)}
\end{aligned}$$

গ $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots \dots \dots$

এখানে,

প্রথম পদ, $a = 1$

সাধারণ অনুপাত, $r = \frac{1}{3} < 1$

আমরা জানি,

গুণোত্তর ধারার প্রথম n টি পদের সমষ্টি,

$$S = \frac{a(1-r^n)}{1-r} \quad [\square r < 1]$$

$$\therefore \text{প্রথম 7টি পদের সমষ্টি} = \frac{1 \left(1 - \frac{1}{3^7}\right)}{1 - \frac{1}{3}}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\frac{3^7 - 1}{3^7}}{\frac{3 - 1}{3}} \\
&= \frac{2187 - 1}{3^7} \times \frac{3}{2} \\
&= \frac{2186}{2187} \times \frac{3}{2} \\
&= \frac{1093}{729} \text{ (Ans.)}
\end{aligned}$$

প্রশ্ন 8৭ একটি গুণোত্তর ধারার সাধারণ পদ $8\sqrt{2} \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)^n$ ।

[বগুড়া জিলা স্কুল, বগুড়া // প্রশ্ন নং ৩]

- ক. ধারাটির প্রথম পদ নির্ণয় কর। ২
- খ. ধারাটির কততম পদ $-\frac{1}{8}$ তা নির্ণয় কর। ৪
- গ. যদি ধারাটির n সংখ্যক পদের সমষ্টি $-\frac{16\sqrt{2}+1}{2(\sqrt{2}+1)}$ হয়, তবে n এর মান নির্ণয় কর। ৪

৪৭ নং প্রশ্নের সমাধান

ক ধারাটির সাধারণ পদ $= 8\sqrt{2} \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)^n$

\therefore ধারাটির প্রথম পদ $= 8\sqrt{2} \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)^1$

$$= 8\sqrt{2} \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right) = -8 \text{ (Ans.)}$$

খ ধারাটির সাধারণ পদ $= 8\sqrt{2} \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)^n$

ধরি, r তম পদ $= -\frac{1}{8}$

$$\therefore 8\sqrt{2} \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)^r = -\frac{1}{8}$$

$$\text{বা, } \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)^r = -\frac{1}{64\sqrt{2}}$$

$$\text{বা, } \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)^r = \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)^{13}$$

$\therefore r = 13$

অর্থাৎ, 13 তম পদ $-\frac{1}{8}$ (Ans.)

গ ধারাটির প্রথম পদ, $a = -8$

সাধারণ পদ $= 8\sqrt{2} \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)^n$

$$\therefore \text{২য় পদ} = 8\sqrt{2} \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)^2 = 8\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} = 4\sqrt{2}$$

$$\text{৩য় পদ} = 8\sqrt{2} \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)^3 = 8\sqrt{2} \times \frac{-1}{2\sqrt{2}} = -4$$

\therefore ধারাটি $-8 + 4\sqrt{2} - 4 + \dots \dots \dots$

\therefore ধারাটির সাধারণ অনুপাত, $r = \frac{4\sqrt{2}}{-8} = -\frac{1}{\sqrt{2}} < 1$

\therefore ধারাটির প্রথম n পদের সমষ্টি $S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$

$$= \frac{-8 \left\{1 - \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)^n\right\}}{1 - \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)}$$

$$= \frac{-8 \left\{1 - \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)^n\right\}}{1 + \frac{1}{\sqrt{2}}}$$

$$= \frac{-8 \left\{1 - \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)^n\right\}}{\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}}}$$

$$= \frac{-8\sqrt{2} \left\{1 - \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)^n\right\}}{\sqrt{2}+1}$$

শর্তমতে, $\frac{-8\sqrt{2} \left\{1 - \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)^n\right\}}{\sqrt{2}+1} = \frac{-(16\sqrt{2}+1)}{2(\sqrt{2}+1)}$

বা, $-16\sqrt{2} \left\{1 - \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)^n\right\} = -16\sqrt{2} - 1$

বা, $-16\sqrt{2} + 16\sqrt{2} \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)^n = -16\sqrt{2} - 1$

বা, $16\sqrt{2} \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)^n = -1$

বা, $\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)^n = \frac{-1}{16\sqrt{2}}$

বা, $\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)^n = \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)^9$

$\therefore n = 9$ (Ans.)

প্রশ্ন 8৮ $5 + p + q + 135$ একটি গুণোত্তর ধারা।

[বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া // প্রশ্ন নং ৩]

- ক. ধারাটির সাধারণ অনুপাত নির্ণয় কর। ২
- খ. p ও q এর মান নির্ণয় কর। ৪
- গ. প্রদত্ত ধারাটির প্রথম পদকে প্রথম পদ এবং সাধারণ অনুপাতকে সাধারণ অন্তর ধরে নতুন ধারা নির্ণয় কর। এবং ধারাটির প্রথম 25টি পদের যোগফল নির্ণয় কর। ৪

৪৮ নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রথম পদ, $a = 5$

চতুর্থ পদ $= 135$

বা, $ar^{4-1} = 135$ [যেখানে $r =$ সাধারণ অনুপাত]

বা, $5.r^3 = 135$

বা, $r^3 = 27$

$\therefore r = 3$

\therefore সাধারণ অনুপাত 3 (Ans.)

খ এখানে, প্রথম পদ, $a = 5$

সাধারণ অনুপাত, $r = 3$ [‘ক’ থেকে]

\therefore $p =$ দ্বিতীয় পদ $= ar^{2-1} = 5 \times 3 = 15$

$q =$ তৃতীয় পদ $= ar^{3-1} = 5 \times 3^2 = 45$ (Ans.)

গ প্রশ্নানুসারে,

সমান্তর ধারার প্রথম পদ, $a = 5$

এবং সমান্তর ধারার সাধারণ অন্তর, $d = 3$

\therefore নতুন ধারাটি: $a + (a+d) + (a+2d) + (a+3d) + \dots \dots \dots$
 $= 5 + (5+3) + (5+2 \cdot 3) + (5+3 \cdot 3) + \dots \dots \dots$

= 5 + 8 + 11 + 14 + ... (Ans.)

আমরা জানি,

সমান্তর ধারার প্রথম n পদের সমষ্টি, $S_n = \frac{n}{2} \{2a + (n - 1)d\}$

∴ ধারাটির প্রথম 25টি পদের সমষ্টি $S_{25} = \frac{25}{2} \{2.5 + (25 - 1).3\}$
 $= \frac{25}{2} (10 + 24.3)$
 $= 1025$ (Ans.)

প্রশ্ন ▶ ৪৯ একটি গুণোত্তর ধারার ৪র্থ পদ $\frac{1}{3}$ এবং দশম পদ $\frac{1}{81}$ এবং অপর সমান্তর ধারার ১ম 12 পদের সমষ্টি 222 এবং ১ম 24 পদের সমষ্টি 876.

[দিনাজপুর জিলা স্কুল, দিনাজপুর 1/ প্রশ্ন নং ৩]

- ক. $3 + 5 + 7 + 9 + \dots$ ধারার কোন পদ 303? 2
 খ. গুণোত্তর ধারাটি নির্ণয় কর। 8
 গ. সমান্তর ধারাটির 60 তম পদ নির্ণয় কর। 8

৪৯ নং প্রশ্নের সমাধান

সৃজনশীল ৫ নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ▶ ৫০ $6 + x + y + z + 96 + \dots$ একটি গুণোত্তর ধারা। $x > 0, y > 0$ এবং $z > 0$

[রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর 1/ প্রশ্ন নং ৩]

- ক. একটি সমান্তর ধারার সাধারণ পদ $2n - 1$ ($n \in \mathbb{N}$) হলে, ধারাটি নির্ণয় কর। 2
 খ. x, y এবং z এর মান নির্ণয় কর। 8
 গ. উদ্দীপকের ধারাটি লেখ। ধারাটির প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি 6138 হলে, n এর মান নির্ণয় কর। 8

৫০ নং প্রশ্নের সমাধান

ক সৃজনশীল ১২(ক) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

খ $6 + x + y + z + 96 + \dots$

ধারাটির ১ম পদ = $a = 6$

সাধারণ অনুপাত r হলে,

২য় পদ, $x = ar^1$

৩য় পদ, $y = ar^2$

৪র্থ পদ, $z = ar^3$

৫ম পদ, $96 = ar^4$

বা, $96 = 6.r^4$

বা, $r^4 = 16 = 2^4$

∴ $r = \pm 2$

∴ $x = 6.(\pm 2) = \pm 12$

$y = 6.(\pm 2)^2 = 24$

$z = 6.(\pm 2)^3 = \pm 48$

যেহেতু $x > 0, y > 0$ এবং $z > 0$

∴ $x = 12, y = 24$ এবং $z = 48$ (Ans.)

গ প্রদত্ত ধারাটি হবে, $6 + 12 + 24 + 48 + 96 + \dots$

এখানে, প্রথম পদ, $a = 6$

সাধারণ অনুপাত, $r = 2 > 1$

প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি,

$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$ [$\because r > 1$]

বা, $6138 = \frac{6(2^n - 1)}{2 - 1}$

বা, $2^n - 1 = 1023$

বা, $2^n = 1023 + 1$

বা, $2^n = 1024$

বা, $2^n = 2^{10}$

∴ $n = 10$ (Ans.)

প্রশ্ন ▶ ৫১ একটি সমান্তর ধারার p তম, q তম এবং r তম পদ যথাক্রমে x, y, z এবং অপর একটি গুণোত্তর ধারা $6 + a + b + c + \frac{3}{8} + \dots$

[রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর 1/ প্রশ্ন নং ৩]

- ক. $ax - cy = 0, cx - ay = c^2 - a^2$ সমীকরণ জোট সংগতিপূর্ণ কিনা নির্ধারণ কর। 2
 খ. উদ্দীপকের সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে দেখাও যে, $x(q - r) + y(r - p) + z(p - q) = 0$ । 8
 গ. উদ্দীপকের গুণোত্তর ধারাটির ক্ষেত্রে a, b ও c এর মান নির্ণয় কর। 8

৫১ নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $ax - cy = 0$

$cx - ay = c^2 - a^2$

এখানে, x ও y এর সহগদ্বয়ের অনুপাত যথাক্রমে $\frac{a}{c}$ এবং $\frac{-c}{-a} = \frac{c}{a}$ যারা পরস্পর অসমান।

∴ সমীকরণদ্বয় সঙ্গতিপূর্ণ।

খ সৃজনশীল ৪৫(গ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

গ সৃজনশীল ২২(খ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ▶ ৫২ (i) $3 + 6 + 9 + 12 + \dots$ ধারাটির ১ম n সংখ্যক পদের সমষ্টি 630.

(ii) $\frac{1}{\sqrt{2}} - 1 + \sqrt{2} - \dots$ একটি গুণোত্তর ধারা

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর, নীলফামারী 1/ প্রশ্ন নং ৩]

- ক. $4 + 7 + 10 + 13 + \dots$ ধারাটির কোন পদ 301? 2
 খ. (i)নং ধারাটি হতে n-এর মান নির্ণয় কর। 8
 গ. (ii)নং ধারাটির কোন পদ $8\sqrt{2}$? 8

৫২ নং প্রশ্নের সমাধান

ক $4 + 7 + 10 + 13 + \dots$

ধারাটির প্রথম পদ $a = 4$

সাধারণ অন্তর $d = 3$

ধরি, n তম পদ = 301

বা, $a + (n - 1)d = 301$

বা, $4 + (n - 1) \times 3 = 301$

বা, $3(n - 1) = 301 - 4$

বা, $3(n - 1) = 297$

বা, $n - 1 = 99$

∴ $n = 99 + 1 = 100$ (Ans.)

খ সৃজনশীল ৮(খ)নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

গ সৃজনশীল ১৪(খ)নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ▶ ৫৩ একটি সমান্তর ধারার p তম, q তম এবং r তম পদ যথাক্রমে x, y এবং z। আবার একটি গুণোত্তর ধারার তৃতীয় পদ $\frac{1}{\sqrt{3}}$ এবং পঞ্চম পদ $\frac{2\sqrt{3}}{9}$ ।

◀সমন্বিত অধ্যায় ১২ ও ১৩

[সৈয়দপুর সরকারি কারিগরী কলেজ, নীলফামারী 1/ প্রশ্ন নং ৩]

- ক. $ax - cy = 0, cx - ay = c^2 - a^2$ সমীকরণ জোট সঙ্গতিপূর্ণ কিনা নির্ণয় কর। 2
 খ. সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে দেখাও যে, $x(q - r) + y(r - p) + z(p - q) = 0$ 8
 গ. গুণোত্তর ধারাটির প্রথম পাঁচটি পদ নির্ণয় কর। 8

৫৩ নং প্রশ্নের সমাধান

ক সৃজনশীল ৫১(ক) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

খ সৃজনশীল ৪৫(গ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

গ মনে করি,

গুণোত্তর ধারার ১ম পদ = a

সাধারণ অনুপাত = r

∴ ধারাটির পঞ্চম পদ = $ar^{5-1} = ar^4$

এবং " তৃতীয় পদ = $ar^{3-1} = ar^2$

উদ্দীপক অনুসারে,

$$ar^4 = \frac{2\sqrt{3}}{9} \dots \dots (i)$$

$$ar^2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \dots \dots (ii)$$

(i) নং ÷ (ii) নং হতে পাই,

$$\frac{ar^4}{ar^2} = \frac{2\sqrt{3}}{9} \div \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } r^2 = \frac{2\sqrt{3}}{9} \times \frac{\sqrt{3}}{1}$$

$$\text{বা, } r^2 = \frac{2}{3}$$

$$\therefore r = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

r এর মান (ii) নং এ বসিয়ে পাই,

$$ar^2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } a \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } a \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } a = \frac{3}{2\sqrt{3}}$$

$$\therefore a = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore \text{প্রথম পদ} = a = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{দ্বিতীয় পদ} = ar^{2-1} = ar$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{তৃতীয় পদ} = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ [দেওয়া আছে]}$$

$$\text{চতুর্থ পদ} = ar^{4-1} = ar^3$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^3$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{3}}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$\text{এবং পঞ্চম পদ} = \frac{2\sqrt{3}}{9} \text{ [দেওয়া আছে]}$$

$$\therefore \text{ধারাটির প্রথম পাঁচটি পদ হলো: } \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{9} \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন ৫৪ একটি সমান্তর ধারার প্রথম 10 পদের সমষ্টি 155 এবং প্রথম 20 পদের সমষ্টি 610, অপর একটি গুণোত্তর ধারার চতুর্থ পদ 2 এবং নবম পদ $8\sqrt{2}$ ।

[কুমিল্লা জিলা স্কুল, কুমিল্লা ৷/ প্রশ্ন নং ২]

ক. প্রথম 50টি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি নির্ণয় কর। ২

খ. সমান্তর ধারাটির 35 তম পদ নির্ণয় কর। 8

গ. গুণোত্তর ধারাটির নবম পদ হতে বিশতম পদ পর্যন্ত 12টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। 8

৫৪ নং প্রশ্নের সমাধান

ক আমরা জানি, প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি,

$$S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

\therefore প্রথম 50টি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি

$$= \frac{50(50+1)(2 \times 50+1)}{6}$$

$$= \frac{50 \times 51 \times 101}{6}$$

$$= 42925 \text{ (Ans.)}$$

খ মনে করি,

সমান্তর ধারার 1ম পদ = a, সাধারণ অন্তর = d, পদ সংখ্যা = n
আমরা জানি,

$$\text{সমান্তর ধারার n পদের সমষ্টি} = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\}$$

দেওয়া আছে, 1ম 10 পদের সমষ্টি = 155

$$\text{বা, } \frac{10}{2} \{2a + (10-1)d\} = 155$$

$$\text{বা, } 5(2a + 9d) = 155$$

$$\therefore 2a + 9d = 31 \dots \dots (i)$$

এবং 1ম 20 পদের সমষ্টি = 610

$$\text{বা, } \frac{20}{2} \{2a + (20-1)d\} = 610$$

$$\text{বা, } 10(2a + 19d) = 610$$

$$\therefore 2a + 19d = 61 \dots \dots \dots (ii)$$

(ii) নং থেকে (i) নং বিয়োগ করে পাই,

$$10d = 30 \text{ বা, } d = \frac{30}{10} \therefore d = 3$$

(i) নং এ d = 3 বসিয়ে পাই,

$$2a + 9 \cdot 3 = 31$$

$$\text{বা, } 2a + 27 = 31$$

$$\text{বা, } 2a = 4 \therefore a = 2$$

আমরা জানি,

$$\text{সমান্তর ধারার n তম পদ} = a + (n-1)d$$

$$\therefore 35 \text{ তম পদ} = a + (35-1)d = 2 + 34 \times 3 = 104 \text{ (Ans.)}$$

গ ধরি, ধারাটির 1ম পদ = a

সাধারণ অনুপাত = r

$$\therefore \text{ধারাটির 8র্থ পদ} = ar^{4-1}$$

$$\therefore ar^3 = 2$$

এবং ধারাটির 8ম পদ = ar^{9-1}

$$\therefore ar^8 = 8\sqrt{2}$$

$$\therefore \frac{ar^8}{ar^3} = \frac{8\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{বা, } r^5 = 4\sqrt{2}$$

$$\text{বা, } r^5 = (\sqrt{2})^5$$

$$\therefore r = \sqrt{2}$$

এখন, $a(\sqrt{2})^3 = 2$ [r-এর মান বসিয়ে]

$$\text{বা, } a = \frac{2}{(\sqrt{2})^3}$$

$$\text{বা, } a = \frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}$$

$$\therefore a = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ধারাটি} : \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} (\sqrt{2})^2 + \dots \dots \dots$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 + \sqrt{2} + \dots \dots \dots \text{ (Ans.)}$$

ধারাটির 1ম 8টি পদের সমষ্টি,

$$S_8 = a \cdot \frac{r^8 - 1}{r - 1} \quad [\square r > 1]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{(\sqrt{2})^8 - 1}{\sqrt{2} - 1}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{16 - 1}{\sqrt{2} - 1}$$

$$= \frac{15}{2 - \sqrt{2}}$$

আবার, 1ম 20টি পদের সমষ্টি,

$$S_{20} = a \cdot \frac{r^{20} - 1}{r - 1} \quad [\square r > 1]$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{(\sqrt{2})^{20} - 1}{\sqrt{2} - 1} \\ &= \frac{1024 - 1}{\sqrt{2}(\sqrt{2} - 1)} \\ &= \frac{1023}{2 - \sqrt{2}} \end{aligned}$$

∴ ধারাটির 9ম পদ হতে 12টি পদের সমষ্টি = S₂₀ - S₈

$$\begin{aligned} &= \frac{1023}{2 - \sqrt{2}} - \frac{15}{2 - \sqrt{2}} \\ &= \frac{1023 - 15}{2 - \sqrt{2}} \\ &= \frac{1008}{2 - \sqrt{2}} \\ &= \frac{1008(2 + \sqrt{2})}{(2 - \sqrt{2})(2 + \sqrt{2})} = \frac{1008(2 + \sqrt{2})}{2^2 - (\sqrt{2})^2} \\ &= \frac{1008(2 + \sqrt{2})}{4 - 2} \\ &= 504(2 + \sqrt{2}) \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

প্রশ্ন ▶ ৫৫ একটি সমান্তর ধারার m-তম পদ m² এবং n-তম পদ n²। একটি গুণোত্তর ধারার অষ্টম পদ -27 এবং একাদশ পদ 81√3।

◀ সমন্বিত অধ্যায় ৪ ও ১৩

[গভঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, কুমিল্লা // প্রশ্ন নং ৩]

- ক. a = 2, b = 3 হলে a - {a⁻¹ + (b⁻¹ - a⁻¹)}⁻¹ এর মান কত? ২
- খ. সমান্তর ধারাটির m + n - 1 তম পদ নির্ণয় কর। ৪
- গ. দেখাও যে, গুণোত্তর ধারাটির পাঁচটি পদের সমষ্টি $\frac{1 + 9\sqrt{3}}{3 + \sqrt{3}}$ । ৪

৫৫ নং প্রশ্নের সমাধান

- ক দেওয়া আছে, a = 2, b = 3
প্রদত্ত রাশি = a - {a⁻¹ + (b⁻¹ - a⁻¹)}⁻¹
= 2 - {2⁻¹ + (3⁻¹ - 2⁻¹)}⁻¹
= 2 - \left\{ \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right\}^{-1}
= 2 - \left(\frac{1}{3} \right)^{-1}
= 2 - 3 = -1 (Ans.)

খ সৃজনশীল ৩২(খ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

- গ মনে করি,
গুণোত্তর ধারাটির ১ম পদ = a
সাধারণ অনুপাত = r
∴ অষ্টম পদ = ar⁸⁻¹ = ar⁷
একাদশ পদ = ar¹¹⁻¹ = ar¹⁰
শর্তমতে, ar⁷ = -27 ... (i)
ar¹⁰ = 81√3 ... (ii)
(ii) নং কে (i) নং দ্বারা ভাগ করে পাই,
r³ = -3√3
বা, r³ = (-√3)³
∴ r = -√3, r < 1
(i) নং এ r = -√3 বসিয়ে পাই,
a(-√3)⁷ = -27
বা, -a × 27√3 = -27
বা, a = $\frac{1}{\sqrt{3}}$
∴ ধারাটির ১ম পাঁচটি পদের সমষ্টি = $\frac{1}{\sqrt{3}} \{1 - (-\sqrt{3})^5\}$
 $\frac{1}{1 - (-\sqrt{3})}$
 $\frac{1}{\sqrt{3}} (1 + 9\sqrt{3})$
 $\frac{1}{1 + \sqrt{3}}$

$$\begin{aligned} &= \frac{1 + 9\sqrt{3}}{\sqrt{3}(1 + \sqrt{3})} \\ &= \frac{1 + 9\sqrt{3}}{3 + \sqrt{3}} \text{ (দেখানো হলো)} \end{aligned}$$

প্রশ্ন ▶ ৫৬ একটি সমান্তর ধারার 15-তম পদ 89 এবং 21-তম পদ 125 এবং অপর একটি গুণোত্তর ধারা $-\frac{1}{2} + x + y + z - 2 + \dots$

[হিম্মাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা // প্রশ্ন নং ২]

- ক. 7 + 11 + 15 + ধারাটির 210 তম পদ নির্ণয় কর। ২
- খ. উদ্দীপকের সমান্তর ধারাটির প্রথম 25টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪
- গ. উদ্দীপকের গুণোত্তর ধারাটির x, y ও z এর মান নির্ণয় কর। ৪

৫৬ নং প্রশ্নের সমাধান

সৃজনশীল ৩ নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ▶ ৫৭ 6 + x + y + z + 96 + ... একটি গুণোত্তর ধারা এবং M = $\frac{14pq}{p+q}$

[কুমিল্লা মডার্ন হাই স্কুল, কুমিল্লা // প্রশ্ন নং ৩]

- ক. দুইটি সংখ্যার অনুপাত 5 : 7 এবং তাদের ল.সা.গু 280 সংখ্যা দুইটির গ.সা.গু নির্ণয় কর। ২
- খ. x, y, z এর মান নির্ণয় কর। ৪
- গ. দেখাও যে, $\frac{M+7p}{M-7p} + \frac{M+7q}{M-7q} = 2$ যেখানে p ≠ q ৪

৫৭ নং প্রশ্নের সমাধান

- ক ধরি, সংখ্যা দুটি 5x ও 7x
∴ সংখ্যা দুটির গ.সা.গু. = x
সংখ্যা দুয়ের ল.সা.গু. = 35x
প্রশ্নমতে, 35x = 280
বা, x = $\frac{280}{35}$
∴ x = 8
∴ সংখ্যা দুটির গ.সা.গু. 8

খ সৃজনশীল ৫০(খ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

গ সৃজনশীল ৩৫(গ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ▶ ৫৮ i) একটি সমান্তর ধারার 13 তম পদ 85

ii) একটি গুণোত্তর ধারার ৪র্থ পদ 3√3 এবং নবম পদ 81

[মাতৃপীঠ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁদপুর // প্রশ্ন নং ৩]

- ক. 2 + 4 + 6 + + 50 ধারাটির সমষ্টি কত? ২
- খ. (i) নং উদ্দীপকের সাহায্যে ধারাটির ১ম 25 পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪
- গ. (ii) নং উদ্দীপকের সাহায্যে ধারাটির ৪ পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪

৫৮ নং প্রশ্নের সমাধান

- ক 2 + 4 + 6 + + 50
প্রথম পদ a = 2
সাধারণ অন্তর d = 4 - 2 = 2
n তম পদ = a + (n - 1)d
বা, 50 = 2 + (n - 1)2
বা, 50 = 2 + 2n - 2
বা, 50 = 2n
∴ n = 25
∴ সমষ্টি S_n = $\frac{n}{2} \{2a + (n - 1)d\}$
∴ S₂₅ = $\frac{25}{2} \{2 \times 2 + (25 - 1) 2\}$
 $\frac{25}{2} \{4 + 24 \times 2\}$
 $\frac{25}{2} \times 52$
= 650 (Ans.)

খ মনে করি, সমান্তর ধারাটির প্রথম পদ a এবং সাধারণ অন্তর d
n তম পদ = a + (n - 1)d

$$\therefore 13 \text{ তম পদ} = a + (13 - 1)d$$

$$\text{বা, } 85 = a + 12d$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ম } 25 \text{ পদের সমষ্টি} &= \frac{25}{2} \{2a + (25 - 1)d\} \\ &= \frac{25}{2} (2a + 24d) \\ &= \frac{25}{2} \times 2(a + 12d) \\ &= 25(a + 12d) \\ &= 25 \times 85 \\ &= 2125 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

গ মনে করি, গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ a এবং সাধারণ অনুপাত r

$$\therefore 8 \text{ র্থ পদ} = ar^{4-1}$$

$$\therefore 3\sqrt{3} = ar^3 \dots\dots\dots (i)$$

$$\text{এবং নবম পদ} = ar^{9-1}$$

$$\text{বা, } 81 = ar^8 \dots\dots\dots (ii)$$

এখন, (ii) \div (i) করে পাই,

$$\frac{ar^8}{ar^3} = \frac{81}{3\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } r^5 = \frac{27}{\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } r^5 = \frac{(\sqrt{3})^6}{\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } r^5 = (\sqrt{3})^5$$

$$\therefore r = \sqrt{3}$$

$$\text{আবার, } ar^3 = 3\sqrt{3}$$

$$\text{বা, } a(\sqrt{3})^3 = 3\sqrt{3}$$

$$\text{বা, } a \times 3\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$$

$$\text{বা, } a = 1$$

$$\therefore 1 \text{ম পদ} = 1$$

$$\begin{aligned} \therefore 1 \text{ম } 8 \text{ পদের সমষ্টি} &= \frac{1 \{ (\sqrt{3})^8 - 1 \}}{\sqrt{3} - 1} \\ &= \frac{3^4 - 1}{\sqrt{3} - 1} \\ &= \frac{80}{\sqrt{3} - 1} \\ &= \frac{80(\sqrt{3} + 1)}{(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1)} \\ &= \frac{80(\sqrt{3} + 1)}{2} \\ &= 40(\sqrt{3} + 1) \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

প্রশ্ন ৫৯ একটি গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ a , সাধারণ অনুপাত r , ধারার চতুর্থ পদ-2 এবং নবম পদ $8\sqrt{2}$

[ফেনী সরকারী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, ফেনী ৷ প্রশ্ন নং ৩]

- ক. উপরোক্ত তথ্যগুলোকে দুইটি সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ কর। ২
খ. ধারার প্রথম পদ a , সাধারণ অনুপাত r এবং পদ সংখ্যা n এবং $r > 1$ হলে

$$\text{দেখাও যে, ধারার সমষ্টি } S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \quad 8$$

গ. উদ্দীপক অনুসারে ধারাটি নির্ণয় করে প্রথম 7টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। 8

৫৯ নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, ধারার 1ম পদ $= a$

$$\text{সাধারণ অনুপাত} = r$$

$$\text{ধারার 8 র্থ পদ} = -2$$

$$\text{এবং ৯ম পদ} = 8\sqrt{2}$$

$$\therefore \text{ধারার 8 র্থ পদ} = ar^{4-1}$$

$$\therefore ar^3 = -2 \text{ (Ans.)}$$

$$\text{এবং ধারার 9ম পদ} = ar^{9-1}$$

$$\therefore ar^8 = 8\sqrt{2} \text{ (Ans.)}$$

খ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনী-১৩.২ এর “গুণোত্তর ধারার সমষ্টি নির্ণয়” অংশ দ্রষ্টব্য।
পৃষ্ঠা-২৬১

গ ‘ক’ থেকে পাই,

$$ar^8 = 8\sqrt{2}$$

$$\text{এবং } ar^3 = -2$$

$$\therefore \frac{ar^8}{ar^3} = \frac{8\sqrt{2}}{-2}$$

$$\text{বা, } r^5 = -4\sqrt{2}$$

$$\text{বা, } r^5 = (-\sqrt{2})^5$$

$$\therefore r = -\sqrt{2}$$

অতএব, $a(-\sqrt{2})^3 = -2$ [r এর মান বসিয়ে]

$$\text{বা, } a = \frac{-2}{(-\sqrt{2})^3}$$

$$\text{বা, } a = \frac{-\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}{-\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}$$

$$\therefore a = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$1 \text{ম পদ, } a = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

সাধারণ অনুপাত, $r = -\sqrt{2}$

$$\begin{aligned} \therefore \text{নির্ণেয় ধারাটি} & \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}(-\sqrt{2}) + \frac{1}{\sqrt{2}}(-\sqrt{2})^2 + \dots\dots\dots \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} - 1 + \sqrt{2} - \dots\dots\dots \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

\therefore ধারার 1ম 7টি পদের সমষ্টি

$$S_7 = a \frac{1-r^7}{1-r}; r < 1$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1 - (-\sqrt{2})^7}{1 + (\sqrt{2})}$$

$$= \frac{1 + 8\sqrt{2}}{\sqrt{2}(1 + \sqrt{2})}$$

$$= \frac{1 + 8\sqrt{2}}{\sqrt{2}(1 + \sqrt{2})} \times \frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2} - 1} \text{ [লব ও হরকে } (\sqrt{2} - 1) \text{ দ্বারা গুণ করে]}$$

$$= \frac{\sqrt{2} - 1 + 8.2 - 8\sqrt{2}}{\sqrt{2}(2 - 1)}$$

$$= \frac{15 - 7\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{15\sqrt{2} - 14}{2} \text{ [লব ও হরকে } \sqrt{2} \text{ দ্বারা গুণ করে]}$$

$$= \frac{1}{2}(15\sqrt{2} - 14) \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন ৬০ স্মৃতি দাশ 2015 সালে জানুয়ারি মাসে 16000 টাকা বেতনে চাকুরিতে যোগদান করলেন। তার বেতন বৃদ্ধির পরিমাণ প্রতি বছর 5%। প্রতি বছর তার বেতন থেকে 25% ভবিষ্যৎ তহবিল হিসেবে কর্তন করা হয়। তিনি বেতন থেকে বার্ষিক 4% চক্রবৃদ্ধি মুনাফা হারে বছর শেষে একটি ব্যাংকে 15000 টাকা জমা রাখেন। তিনি 2045 সালের 31 ডিসেম্বর চাকুরি থেকে অবসরে যাবেন। [চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম ৷ প্রশ্ন নং ৩]

- ক. স্মৃতি দাশের মূল বেতন কোন ধারাকে সমর্থন করে? ধারাটি লিখ। ২
খ. ভবিষ্যৎ তহবিল ব্যতিত তিনি বেতন হিসাবে চাকুরি জীবনে মোট কত টাকা পাবেন। 8
গ. 2045 সালের 31 ডিসেম্বর ঐ ব্যাংকে মুনাফার সাথে তার মোট কত টাকা জমা হবে? 8

৬০ নং প্রশ্নের সমাধান

ক স্মৃতি দাশের মাসিক বেতন = 16,000 টাকা

$$\therefore \text{স্মৃতি দাশের বার্ষিক বেতন} = (16,000 \times 12) = 1,92,000 \text{ টাকা}$$

স্মৃতি দাশের বার্ষিক বেতন প্রতি বছর 5% বৃদ্ধি পায়।

$$\therefore \text{প্রথম বছর শেষে বা ২য় বছরে তার বার্ষিক বেতন} = 1,92,000 \times 1.05$$

$$\therefore \text{৩য় বছরে তার বার্ষিক বেতন} = 1,92,000 \times (1.05)^2$$

$$8 \text{ র্থ বছরে তার বার্ষিক বেতন} = 1,92,000 \times (1.05)^3$$

∴ স্মৃতি দাশের প্রতি বছর বেতনের ধারাটি,
 $1,92,000 + 1,92,000 \times 1.05 + 1,92,000 \times (1.05)^2 + \dots$ (Ans.)
 প্রতি বছর বেতন বৃদ্ধির অনুপাত, $r = \frac{1,92,000 \times 1.05}{1,92,000} = 1.05$
 ∴ স্মৃতি দাশের বেতনের ধারাটি একটি গুণোত্তর ধারা (Ans.)

খ 2015 সালের জানুয়ারি থেকে 2045 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট
 (2045 - 2015 + 1) বা, 31 বছর
 31 বছরে ভবিষ্যৎ তহবিল ব্যতিত তার বেতন বাবদ প্রাপ্য টাকার পরিমাণ
 $(1,92,000 - 1,92,000 \times 0.25) + (1,92,000 \times 1.05 - 1,92,000 \times 1.05 \times 0.25)$
 $+ \{1,92,000 \times (1.05)^2 - 1,92,000 \times (1.05)^2 \times 0.25\} + \dots$
 $= 1,92,000 (1 - 0.25) + 1,92,000 \times 1.05 (1 - 0.25) + 1,92,000 \times (1.05)^2 (1$
 $- 0.25) + \dots$
 $= (1 - 0.25) \{1,92,000 + 1,92,000 \times 1.05 + 1,92,000 \times (1.05)^2 + \dots\}$
 $= 0.75 \times 1,92,000 (1 + 1.05 + 1.05^2 + \dots)$
 $= 1,44,000 (1 + 1.05 + 1.05^2 + \dots)$
 বন্ধনীর মধ্যে প্রাপ্ত ধারাটি একটি গুণোত্তর ধারা যার প্রথম পদ $a = 1$
 সাধারণ অনুপাত $r = \frac{1.05}{1} = 1.05$
 এবং পদসংখ্যা $n = 31$
 ∴ 31 বছরে তার প্রাপ্য মোট বেতনের পরিমাণ
 $= 1,44,000 \times a \frac{r^n - 1}{r - 1}$ [$r > 1$]
 $= 1,44,000 \times 1 \times \frac{(1.05)^{31} - 1}{1.05 - 1}$
 $= 1,44,000 \times 70.761$
 $= 1,01,89,584$
 ∴ ভবিষ্যৎ তহবিল ব্যতিত বেতন হিসাবে চাকুরি জীবনে তিনি মোট
 1,01,89,584 টাকা পাবেন। (Ans.)

গ স্মৃতি দাশ বছর শেষে 15,000 হাজার টাকা 4% চক্রবৃদ্ধি সুদে জমা রাখেন।
 ∴ প্রথম বছর শেষে জমা করা 15,000 টাকা 4% চক্রবৃদ্ধি হার সুদে
 (31 - 1) বা, 30 বছরে সুদে আসলে হবে = $15,000 (1.04)^{30}$
 অনুরূপভাবে, 2য় বছর শেষে জমা করা টাকা (31 - 2) বা 29 বছরে সুদে আসলে
 হবে = $15,000 (1.04)^{29}$
 অনুরূপভাবে, 3য় বছর শেষে জমা করা টাকা সুদ আসলে হবে = $15,000$
 $(1.04)^{28}$
 এভাবে, 2045 সালের ডিসেম্বরে জমা করা 15,000 টাকা সুদে আসলে হবে =
 $15,000 \times (1.04)^0$
 ∴ 2045 সালের 31 ডিসেম্বর ঐ ব্যাংকে মুনাফা আসলে তার জমাকৃত টাকার
 পরিমাণ
 $15,000 \times 1.04^{30} + 15,000 \times 1.04^{29} + \dots + 15,000 \times 1.04^0$
 $= 15,000 (1 + 1.04 + 1.04^2 + \dots + 1.04^{30})$
 $= 15,000 \times 1 \times \frac{1.04^{31} - 1}{1.04 - 1}$
 $= 15,000 \times 59.33$
 $= 889950$
 ∴ 2045 সালের 31 ডিসেম্বর ঐ ব্যাংকে মুনাফার সহিত স্মৃতি দাশের 889950
 টাকা জমবে। (Ans.)

প্রশ্ন ৬১ একটি গুণোত্তর ধারার 8র্থ পদ $\frac{1}{\sqrt{2}}$, ৯ম পদ $\frac{1}{8}$ এবং একটি সমান্তর ধারার
 p তম পদ x, q তম পদ y

[ডা: খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম // প্রশ্ন নং ২]

- ক. প্রথম 12টি জোড় স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি নির্ণয় কর। ২
 খ. সমান্তর ধারাটির $p + q - 1$ তম পদ নির্ণয় কর। 8
 গ. গুণোত্তর ধারাটি নির্ণয় করে এর 15 তম থেকে 25 তম পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। 8

৬১ নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রথম 12টি জোড় স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি
 $= 2^2 + 4^2 + 6^2 + \dots + 24^2$
 $= 1.2^2 + 2^2.2^2 + 3^2.2^2 + \dots + 12^2.2^2$
 $= 2^2 (1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 12^2)$
 $= 2^2 \times \frac{12 \times (12 + 1) (2 \times 12 + 1)}{6}$

$$[\therefore n \text{ সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি, } S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}]$$

$$= 4 \times \frac{12 \times 13 \times 25}{6}$$

$$= 2600 \text{ (Ans.)}$$

খ ধরি,
 সমান্তর ধারার 1ম পদ = a
 সাধারণ অন্তর = d
 আমরা জানি,
 সমান্তর ধারার p তম পদ = $a + (p - 1)d$
 ∴ q তম পদ = $a + (q - 1)d$
 সুতরাং $a + (p - 1)d = x$ (i)
 $a + (q - 1)d = y$ (ii)

বিয়োগ করে, $(p - 1 - q + 1)d = x - y$

বা, $(p - q)d = x - y$

বা, $d = \frac{x - y}{p - q}$

(i) নং সমীকরণে d এর মান বসিয়ে পাই,

$$a + \frac{(p - 1)(x - y)}{p - q} = x$$

বা, $a = x - \frac{(p - 1)(x - y)}{p - q}$

এখন, ধারাটির $(p + q - 1)$ তম পদ

$$= a + (p + q - 1 - 1)d$$

$$= x - \frac{(p - 1)(x - y)}{p - q} + (p + q - 2) \frac{x - y}{p - q}$$

[a ও d এর মান বসিয়ে]

$$= \frac{px - qx - px + py + x - y + px - py + qx - qy - 2x + 2y}{p - q}$$

$$= \frac{y - x + px - qy}{p - q}$$

$$= \frac{px - qy + y - x}{p - q} \text{ (Ans.)}$$

গ ধরি,
 গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ = a
 সাধারণ অনুপাত = r
 ∴ n তম পদ = ar^{n-1}
 চতুর্থ পদ = $ar^{4-1} = ar^3$
 নবম পদ = $ar^{9-1} = ar^8$

$$\therefore ar^3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{(i)}$$

$$ar^8 = \frac{1}{8} \text{(ii)}$$

(ii) ÷ (i) নং হতে পাই,

$$\frac{ar^8}{ar^3} = \frac{1}{8} \div \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{বা, } r^5 = \frac{1}{8} \times \sqrt{2} = \frac{1}{2^3} \times \sqrt{2} = \frac{1}{(\sqrt{2})^6} \times \sqrt{2}$$

$$\text{বা, } r^5 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^5$$

$$\therefore r = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

r এর মান (i) নং এ বসাই,

$$ar^3 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{বা, } a \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{বা, } a = \frac{1}{\sqrt{2}} \times (\sqrt{2})^2 \times \sqrt{2}$$

$$\therefore a = 2$$

$$\therefore \text{দ্বিতীয় পদ} = ar = 2 \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

$$\text{তৃতীয় পদ} = ar^2 = 2 \times \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = 1$$

$$\therefore \text{ধারাটি} = 2 + \sqrt{2} + 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots$$

এখানে, 15তম পদ থেকে 25তম পদ পর্যন্ত মোট পদ সংখ্যা

$$= (25 - 15 + 1) = 11 \text{টি}$$

$$15 \text{ তম পদ অর্থাৎ প্রথম পদ} = ar^{15-1} = ar^{14}$$

$$= 2 \times \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{14}$$

$$= 2 \times \frac{1}{2^7}$$

$$= \frac{1}{2^6} = \frac{1}{64}$$

\(\therefore\) 15তম থেকে 25তম পদ পর্যন্ত 11টি পদের সমষ্টি

$$S_{11} = \frac{a(1-r^{11})}{1-r}$$

$$= \frac{\frac{1}{64} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{11} \right\}}{1 - \frac{1}{\sqrt{2}}}$$

$$= \frac{\frac{1}{64} \left(1 - \frac{1}{32\sqrt{2}} \right)}{\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}}}$$

$$= \frac{1}{64} \times \frac{32\sqrt{2}-1}{32\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}$$

$$= \frac{32\sqrt{2}-1}{2048(\sqrt{2}-1)}$$

$$= \frac{(32\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)}{2048 \{ (\sqrt{2})^2 - 1 \}}$$

$$= \frac{32 \times 2 + 32\sqrt{2} - \sqrt{2} - 1}{2048(2-1)}$$

$$= \frac{64 + 31\sqrt{2} - 1}{2048}$$

$$= \frac{63 + 31\sqrt{2}}{2048} \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন ৬২ একটি সমান্তর ধারার p-তম পদ, q-তম পদ এবং r-তম পদ যথাক্রমে x, y, z। অপর একটি ধারা হল $\log 3 + \log 9 + \log 27 + \dots$

[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম ৷/ প্রশ্ন নং ৩]

- ক. প্রথম 53টি স্বাভাবিক সংখ্যার ঘন এর সমষ্টি কত? 2
খ. সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে দেখাও যে, $x(q-r) + y(r-p) + z(p-q) = 0$ 8
গ. ধারাটির 1ম দশটি ও 1ম বারটি পদের সমষ্টির পার্থক্য নির্ণয় কর। 8

৬২ নং প্রশ্নের সমাধান

ক আমরা জানি,

$$\text{প্রথম } n \text{ তম স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি} = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$$

$$\therefore \text{প্রথম 53টি স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি} = \left\{ \frac{53(53+1)}{2} \right\}^2$$

$$= (53 \times 27)^2$$

$$= 2047761 \text{ (Ans.)}$$

খ সৃজনশীল 8৫(গ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

গ প্রদত্ত ধারাটি, $\log 3 + \log 9 + \log 27 + \dots$

$$= \log 3 + \log 3^2 + \log 3^3 + \dots$$

$$= \log 3 + 2 \log 3 + 3 \log 3 + \dots$$

$$= \log 3 (1 + 2 + 3 + \dots)$$

\(\therefore\) ধারাটির প্রথম 12টি এবং 10টি পদের সমষ্টির পার্থক্য

$$= \left\{ \frac{12(12+1)}{2} - \frac{10(10+1)}{2} \right\} \log 3$$

$$= \left(\frac{12 \times 13 - 10 \times 11}{2} \right) \log 3$$

$$= \left(\frac{156 - 110}{2} \right) \log 3 = 23 \log 3 \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন ৬৩ কোনো একটি গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ a, সাধারণ অনুপাত r এবং ধারাটির পঞ্চম পদ $3\sqrt{3}$ এবং অষ্টম পদ -27 ।

[বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, চট্টগ্রাম ৷/ প্রশ্ন নং ৩]

- ক. উপরের তথ্যগুলোর দুইটি সমীকরণের এবং মাধ্যমে প্রকাশ কর। 2
খ. ধারাটির দশম পদ নির্ণয় কর। 8
গ. গুণোত্তর ধারাটি নির্ণয় করে প্রথম আটটি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। 8

৬৩ নং প্রশ্নের সমাধান

ক গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ a এবং সাধারণ অনুপাত r হলে, n-তম পদ $= ar^{n-1}$

$$\therefore \text{পঞ্চম (n=5) পদ} = ar^{5-1} = ar^4$$

$$\text{এবং অষ্টম (n=8) পদ} = ar^{8-1} = ar^7$$

$$\text{শর্তমতে, } ar^4 = 3\sqrt{3} \dots \dots \dots \text{(i)}$$

$$\therefore ar^7 = -27 \dots \dots \dots \text{(ii)}$$

খ (ii) \(\div\) (i) করে পাই, $\frac{ar^7}{ar^4} = \frac{-27}{3\sqrt{3}}$

$$\text{বা, } r^3 = -3\sqrt{3} = (-\sqrt{3})^3$$

$$\therefore r = -\sqrt{3}$$

(i) নং সমীকরণে r এর মান বসিয়ে,

$$a(-\sqrt{3})^4 = 3\sqrt{3}$$

$$\text{বা, } a \cdot 9 = 3\sqrt{3}$$

$$\text{বা, } a = \frac{3\sqrt{3}}{9} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\therefore a = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore \text{ধারাটির দশম (n=10) পদ} = ar^{10-1} = ar^9$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot (-\sqrt{3})^9$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{3}} \cdot (\sqrt{3})^9$$

$$= -(\sqrt{3})^8 = -81 \text{ (Ans.)}$$

গ 'খ' হতে পাই, প্রথম পদ, $a = \frac{1}{\sqrt{3}}$

এবং সাধারণ অনুপাত, $r = -\sqrt{3} < 1$

$$\therefore \text{গুণোত্তর ধারাটি: } a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}}(-\sqrt{3}) + \frac{1}{\sqrt{3}}(-\sqrt{3})^2 + \frac{1}{\sqrt{3}}(-\sqrt{3})^3 + \dots$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} - 1 + \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot (\sqrt{3})^2 - \frac{1}{\sqrt{3}}(\sqrt{3})^3 + \dots$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} - 1 + \sqrt{3} - 3 + \dots$$

গুণোত্তর ধারাটির প্রথম আটটি পদের সমষ্টি

$$S_8 = \frac{a(1-r^8)}{1-r}$$

$$= \frac{\frac{1}{\sqrt{3}} \{ 1 - (-\sqrt{3})^8 \}}{1 - (-\sqrt{3})}$$

$$= \frac{1 - 81}{\sqrt{3}(1 + \sqrt{3})}$$

$$= \frac{-80}{(3 + \sqrt{3})}$$

$$= \frac{-80(3 - \sqrt{3})}{(3 + \sqrt{3})(3 - \sqrt{3})}$$

$$= \frac{-80(3 - \sqrt{3})}{3^2 - (\sqrt{3})^2}$$

$$= \frac{-80(3 - \sqrt{3})}{6} = \frac{40}{3}(\sqrt{3} - 3) \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন ৬৪ (i) $\frac{1}{\sqrt{7}} - 1 + \sqrt{7} \dots$ একটি গুণোত্তর ধারা।

(ii) একটি সমান্তর ধারার n সংখ্যক পদের সমষ্টি $\frac{3n^2 + 5n}{2}$

[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম ৷/ প্রশ্ন নং ২]

- ক. সমান্তর ধারাটির ১ম ৫টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ২
 খ. গুণোত্তর ধারাটির কোন পদের মান $2401\sqrt{7}$, তা নির্ণয় কর। ৪
 গ. সমান্তর ধারাটি নির্ণয় কর এবং ধারাটির ১২ তম পদ নির্ণয় কর। ৪

৬৪ নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

$$n \text{ সংখ্যক পদের সমষ্টি} = \frac{3n^2 + 5n}{2}$$

$$\therefore \text{প্রথম ৫টি পদের সমষ্টি} = \frac{3 \times 5^2 + 5 \times 5}{2}$$

$$= \frac{75 + 25}{2}$$

$$= 50$$

খ গুণোত্তর ধারাটি, $\frac{1}{\sqrt{7}} - 1 + \sqrt{7} + \dots$

এখানে, প্রথম পদ, $a = \frac{1}{\sqrt{7}}$

সাধারণ অনুপাত, $r = \frac{-1}{\sqrt{7}} = -\sqrt{7}$

\therefore ধারাটির n তম পদ $= ar^{n-1}$

ধরি, n তম পদ $= 2401\sqrt{7}$

বা, $ar^{n-1} = 2401\sqrt{7}$

বা, $\frac{1}{\sqrt{7}} (-\sqrt{7})^{n-1} = 2401\sqrt{7}$

বা, $(-\sqrt{7})^{n-1} = 2401 \times 7$

বা, $(-\sqrt{7})^{n-1} = (-\sqrt{7})^{10}$

বা, $n-1 = 10$

$\therefore n = 11$

\therefore ১১ তম পদ $2401\sqrt{7}$ (Ans.)

গ সমান্তর ধারাটির n সংখ্যক পদের সমষ্টি, $S_n = \frac{3n^2 + 5n}{2}$

$n = 1, 2, 3, \dots$ বসিয়ে পাই,

$S_1 = 1$ ম ১ পদের সমষ্টি $= \frac{3 \cdot 1^2 + 5 \cdot 1}{2} = 4$

$S_2 = 1$ ম ২ পদের সমষ্টি $= \frac{3 \cdot 2^2 + 5 \cdot 2}{2} = 11$

$S_3 = 1$ ম ৩ পদের সমষ্টি $= \frac{3 \cdot 3^2 + 5 \cdot 3}{2} = 21$

$S_4 = 1$ ম ৪ পদের সমষ্টি $= \frac{3 \cdot 4^2 + 5 \cdot 4}{2} = 34$

\therefore ১ম পদ $= S_1 = 4$

২য় পদ $= S_2 - S_1 = 11 - 4 = 7$

৩য় পদ $= S_3 - S_2 = 21 - 11 = 10$

৪র্থ পদ $= S_4 - S_3 = 34 - 21 = 13$

সুতরাং, ধারাটি $4 + 7 + 10 + 13 + \dots$

এখানে,

১ম পদ, $a = 4$

সাধারণ অন্তর, $d = 7 - 4 = 3$

আমরা জানি,

সমান্তর ধারার r -তম পদ $= a + (r-1)d$

সুতরাং ১২ তম পদ $= 4 + (12-1)3$

$= 4 + 11 \times 3$

$= 37$ (Ans.)

প্রশ্ন ৬৫ $m = \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}$ আবার একটি গুণোত্তর ধারার পঞ্চম পদ $\frac{2\sqrt{3}}{9}$ এবং

দশম পদ $\frac{8\sqrt{2}}{81}$.

◀সম্বিত অধ্যায় ১১ ও ১৩

[চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ, চট্টগ্রাম ৷/ প্রশ্ন নং ৩]

ক. $a \div b = 3 \div 4$ এবং $b \div c = 5 \div 7$ হলে, $a \div b \div c$ এর মান নির্ণয় কর। ২

খ. প্রমাণ কর যে, $m^2 - \frac{2m}{x} + 1 = 0$. ৪

গ. দেখাও যে, গুণোত্তর ধারাটির প্রথম আটটি পদের সমষ্টি $\frac{65}{54}(\sqrt{3} + \sqrt{2})8$

৬৫ নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

$$a \div b = 3 \div 4$$

$$= 3 \times 5 \div 4 \times 5$$

$$= 15 \div 20$$

এবং $b \div c = 5 \div 7$

$$= 5 \times 4 \div 7 \times 4$$

$$= 20 \div 28$$

$\therefore a \div b \div c = 15 \div 20 \div 28$ (Ans.)

খ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনী-১১.১ এর উদাহরণ ৬ দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা-২১১

গ সূজনশীল ১৯(খ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

অতঃপর, ধারাটির প্রথম আটটি পদের সমষ্টি $= a \frac{1-r^8}{1-r}$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \left\{ \frac{1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^8}{1 - \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}} \right\}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{1 - \frac{16}{81}}{\frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{3}}} \right)$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{81 - 16}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} \right)$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{65}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} \right)$$

$$= \frac{65 \times 3}{2 \times 81(\sqrt{3} - \sqrt{2})}$$

$$= \frac{65}{54} \frac{(\sqrt{3} + \sqrt{2})}{(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2})}$$

$$= \frac{65}{54} (\sqrt{3} + \sqrt{2}) \text{ (দেখানো হলো)}$$

প্রশ্ন ৬৬ একজন দৌড়বিদ প্রথম দিন ১০০০ মিটার দৌড়াল এবং পরের দিন থেকে সে আগের চেয়ে ১০০ মিটার বেশি দূরত্ব অতিক্রম করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

◀সম্বিত অধ্যায় ৫ ও ১৩

[চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ৷/ প্রশ্ন নং ৩]

ক. সমাধান কর : $(\sqrt{2}x + 3)(\sqrt{3}x - 2) = 0$ ২

খ. কততম দিনে সে ১০,০০০ মিটার দৌড়াবে? ৪

গ. পরের দিন থেকে ১০০ মিটার বেশি না দৌড়ে সে যদি আগের দিনের অতিক্রান্ত দূরত্বের ১০% বেশি করে দৌড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় তবে ১০ দিনে সে মোট কত কি.মি. দৌড়াবে? ৪

৬৬ নং প্রশ্নের সমাধান

ক $(\sqrt{2}x + 3)(\sqrt{3}x - 2) = 0$

হয় $\sqrt{2}x + 3 = 0$

বা, $\sqrt{2}x = -3$

অথবা, $\sqrt{3}x - 2 = 0$

বা, $\sqrt{3}x = 2$

$$\therefore x = \frac{-3}{\sqrt{2}} = \frac{-3\sqrt{2}}{2}$$

$$\therefore x = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাধান: } x = \frac{-3\sqrt{2}}{2}, \frac{2\sqrt{3}}{3} \text{ (Ans.)}$$

খ অতিক্রান্ত দূরত্বকে নিচে একটি ধারার সাহায্যে প্রকাশ করা হলো:

$$1000 + (1000 + 100) + (1000 + 100 + 100) + \dots$$

$$= 1000 + 1100 + 1200 + \dots$$

$$\text{ধারাটির প্রথম পদ, } a = 1000$$

$$\text{সাধারণ অন্তর, } d = 1100 - 1000 = 100$$

∴ ইহা একটি সমান্তর ধারা।

$$\text{মনে করি, } n\text{-তম দিনে সে } 10000 \text{ মিটার দৌড়াবে।}$$

$$\text{আমরা জানি, } n\text{-তম পদ} = a + (n - 1)d$$

$$\therefore a + (n - 1)d = 10000$$

$$\text{বা, } 1000 + (n - 1)100 = 10,000$$

$$\text{বা, } (n - 1)100 = 9000$$

$$\text{বা, } n - 1 = 90$$

$$\therefore n = 91$$

∴ 91-তম দিনে সে 10,000 মিটার দৌড়াবে। (Ans.)

গ প্রথম দিনে অতিক্রান্ত দূরত্ব = 1000 মিটার

দ্বিতীয় দিনে 10% বেশি অতিক্রম করলে দ্বিতীয় দিনে অতিক্রান্ত দূরত্ব

$$= (1000 + 1000 \text{ এর } 10\%) \text{ মিটার}$$

$$= \left(1000 + 1000 \times \frac{10}{100}\right) \text{ মিটার}$$

$$= (1000 + 100) \text{ মিটার} = 1100 \text{ মিটার}$$

আবার, তৃতীয় দিনে আগের দিনের চেয়ে 10% বেশি অতিক্রম করলে তৃতীয় দিনে

অতিক্রান্ত দূরত্ব = (1100 + 1100 এর 10%) মিটার

$$= \left(1100 + 1100 \times \frac{10}{100}\right) \text{ মিটার}$$

$$= (1100 + 110) \text{ মিটার}$$

$$= 1210 \text{ মিটার}$$

এক্ষেত্রে, অ্যাথলেটের অতিক্রান্ত দূরত্বের ধারাটি হবে নিম্নরূপ:

$$1000 + 1100 + 1210 + \dots$$

$$\text{ধারাটির প্রথম পদ, } a = 1000$$

$$\text{সাধারণ অনুপাত, } r = \frac{1100}{1000} = \frac{11}{10} > 1$$

∴ ধারাটি একটি গুণোত্তর ধারা।

এখানে, 10 দিনে অতিক্রান্ত মোট দূরত্ব নির্ণয় করতে হবে।

$$\text{অর্থাৎ } n = 10$$

আমরা জানি, গুণোত্তর ধারার n সংখ্যক পদের সমষ্টি,

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}, \text{ যখন } r > 1$$

$$\text{সুতরাং ধারাটির 10টি পদের সমষ্টি, } S_{10} = \frac{1000 \left\{ \left(\frac{11}{10}\right)^{10} - 1 \right\}}{\frac{11}{10} - 1}$$

$$= 15937.425$$

∴ 10 দিনে সে মোট 15937.425 মিটার বা, 15.94 কি.মি. দৌড়াবে। (Ans.)

প্রশ্ন ৬৭ একটি গুণোত্তর ধারার 5-তম পদ $\frac{2\sqrt{3}}{9}$ এবং 10 পদ $\frac{8\sqrt{3}}{81}$

[সেন্ট প্লাসিডস হাই স্কুল, চট্টগ্রাম ৷ প্রশ্ন নং ৩]

ক. তথ্যটির উপযুক্ত সমীকরণ গঠন কর। ২

খ. ধারাটির প্রথম পদ বের কর। ৪

গ. ধারাটি তৈরি করে প্রথম 16 টি পদের সমষ্টি বের কর। ৪

৬৭ নং প্রশ্নের সমাধান

ক + খ সৃজনশীল ১৯(খ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

গ 'খ' হতে পাই,

$$\text{১ম পদ, } a = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ এবং সাধারণ অনুপাত, } r = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore \text{ধারাটি} = a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^2 + \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^3 + \dots$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{2}}{3} + \dots \text{ (Ans.)}$$

$$\therefore \text{ধারাটির প্রথম 16টি পদের সমষ্টি} = a \cdot \frac{1 - r^{16}}{1 - r} \quad [r < 1]$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^{16}}{1 - \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1 - \frac{256}{6561}}{\frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{3}}}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} \times \frac{6561 - 256}{6561}$$

$$= \frac{3}{2(\sqrt{3} - \sqrt{2})} \times \frac{6305}{6561}$$

$$= \frac{6305}{4374} (\sqrt{3} + \sqrt{2}) \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন ৬৮ $2x + 5y = -14$

$$4x - 5y = 17$$

কোনো ধারার p তম পদ $3p - 1$, যেখানে $p \in \mathbb{I}$

◀ সমন্বিত অধ্যায় ১২ ও ১৩

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট ৷ প্রশ্ন নং ৩]

ক. $128 + 64 + 32 + \dots$ ধারাটির কোন পদ $\frac{1}{2}$? ২

খ. প্রদত্ত সমীকরণ জোটটির সমাধান আড়গুণন পদ্ধতিতে নির্ণয় কর। ৪

গ. ধারাটি নির্ণয় কর। ধারাটির ১ম পদকে ১ম পদ এবং সাধারণ অন্তরকে সাধারণ অনুপাত ধরে একটি নতুন ধারা তৈরি কর। অতঃপর নতুন ধারাটির প্রথম ৪টি পদের সমষ্টি সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় কর। ৪

৬৮ নং প্রশ্নের সমাধান

ক সৃজনশীল ৩৭(ক) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

খ প্রদত্ত সমীকরণ জোট:

$$2x + 5y = -14$$

$$4x - 5y = 17$$

$$\text{অর্থাৎ } 2x + 5y + 14 = 0$$

$$4x - 5y - 17 = 0$$

আড়গুণন পদ্ধতিতে পাই,

$$\frac{x}{5(-17) - 14(-5)} = \frac{y}{14 \times 4 - 2(-17)} = \frac{1}{2(-5) - 4 \times 5}$$

$$\text{বা, } \frac{x}{-85 + 70} = \frac{y}{56 + 34} = \frac{1}{-10 - 20}$$

$$\text{বা, } \frac{x}{-15} = \frac{y}{90} = \frac{1}{-30}$$

$$\text{অর্থাৎ, } \frac{x}{-15} = \frac{1}{-30} \quad \text{এবং} \quad \frac{y}{90} = \frac{1}{-30}$$

$$\therefore x = \frac{1}{2} \quad \therefore y = -3$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাধান: } (x, y) = \left(\frac{1}{2}, -3\right)$$

গ সমান্তর ধারার p তম পদ বা সাধারণ পদ, $3p - 1$ যেখানে $p \in \mathbb{I}$

$$\therefore \text{১ম পদ} = 3 \times 1 - 1 = 2$$

$$\text{২য় পদ} = 3 \times 2 - 1 = 5$$

$$\text{৩য় পদ} = 3 \times 3 - 1 = 8$$

$$\text{৪র্থ পদ} = 3 \times 4 - 1 = 11$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ধারা: } 2 + 5 + 8 + 11 + \dots$$

$$\text{ধারাটির ১ম পদ, } a = 2$$

$$\text{সাধারণ অন্তর, } d = 8 - 5 = 5 - 2 = 3$$

∴ নতুন ধারার প্রথম পদ, $a = 2$
সাধারণ অনুপাত, $r = 3$
∴ নতুন গুণোত্তর ধারা: $a + ar + ar^2 + \dots$
 $= 2 + 2 \times 3 + 2 \times 3^2 + \dots$
 $= 2 + 6 + 18 + \dots$

এখানে সাধারণ অনুপাত, $r = 3 > 1$

$$\begin{aligned} \therefore \text{প্রথম চারটি পদের সমষ্টি, } S &= \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \\ &= \frac{2(3^4 - 1)}{3 - 1} \\ &= \frac{2(81 - 1)}{2} \\ &= 80 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

প্রশ্ন ▶ ৬৯ একটি সমান্তর ধারার প্রথম 12 পদের সমষ্টি 144 এবং প্রথম 20 পদের সমষ্টি 560.

[সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেট ৷ প্রশ্ন নং ৩]

- ক. প্রদত্ত তথ্যের আলোকে দুইটি সমীকরণ গঠন কর। ২
খ. ধারাটির প্রথম 10 পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। 8
গ. ধারাটির প্রথম n পদের সমষ্টি 320 হলে, n এর মান নির্ণয় কর। 8

৬৯ নং প্রশ্নের সমাধান

ক + খ সৃজনশীল ৩৬(খ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

অতঃপর, প্রথম 10 পদের সমষ্টি $= \frac{10}{2} \{2(-10) + (10-1)4\} = 80 \text{ (Ans.)}$

গ প্রশ্নমতে, $\frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\} = 320$

বা, $\frac{n}{2} \{2(-10) + (n-1)4\} = 320$ [∵ $a = -10$ এবং $d = 4$]

বা, $\frac{n}{2} (-20 + 4n - 4) = 320$

বা, $\frac{n}{2} \times 4(n-6) = 320$

বা, $n^2 - 6n = 160$

বা, $n^2 - 6n - 160 = 0$

বা, $n^2 - 16n + 10n - 160 = 0$

বা, $n(n-16) + 10(n-16) = 0$

বা, $(n-16)(n+10) = 0$

বা, $n-16 = 0$ [$n \neq -10$, কারণ পদসংখ্যা ঋণাত্মক হতে পারে না]

∴ $n = 16 \text{ (Ans.)}$

প্রশ্ন ▶ ৭০ $4 + x + y + z + 1024$ একটি গুণোত্তর ধারা এবং অপর একটি সমান্তর ধারার 1ম 10 পদের সমষ্টি 155 এবং 1ম 20 পদের সমষ্টি 610।

◀ সমন্বিত অধ্যায় ৪ ও ১৩

[ব্লু-বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট ৷ প্রশ্ন নং ৩]

- ক. $a^x = b$, $b^y = c$ এবং $c^z = a$ হলে দেখাও যে, $xyz = 1$ ২
খ. উদ্দীপকে উল্লিখিত গুণোত্তর ধারাটি হতে x , y এবং z এর মান নির্ণয় কর। 8
গ. সমান্তর ধারাটির 30 তম পদ নির্ণয় কর। 8

৭০ নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

$a^x = b$, $b^y = c$, $c^z = a$

এখন, $c^z = a$

বা, $(b^y)^z = a$ [∵ $b^y = c$]

বা, $b^{yz} = a$

বা, $(a^x)^{yz} = a$ [∵ $a^x = b$]

বা, $a^{xyz} = a^1$

∴ $xyz = 1$; [$a^x = a^y$ হলে $x = y$ যখন $a > 0$, $a \neq 1$](দেখানো হলো)

খ দেওয়া আছে, $4 + x + y + z + 1024$ গুণোত্তর ধারা।

ধরি, ধারাটির প্রথম পদ $a = 4$

সাধারণ অনুপাত $= r$

∴ পঞ্চম পদ $ar^{5-1} = 1024$

বা, $4r^4 = 1024$

বা, $r^4 = 256$

বা, $r^4 = (\pm 4)^4$

∴ $r = \pm 4$

∴ দ্বিতীয় পদ, $x = 4(\pm 4)^{2-1} = \pm 16$

তৃতীয় পদ, $y = 4(\pm 4)^{3-1} = 64$

এবং চতুর্থ পদ, $z = 4(\pm 4)^{4-1} = \pm 256$

∴ x , y ও z এর মান যথাক্রমে ± 16 , 64 ও $\pm 256 \text{ (Ans.)}$

গ সৃজনশীল ৯(গ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ▶ ৭১ $5 + p + q + 320 + \dots$ একটি ধারা।

[মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর ৷ প্রশ্ন নং ৩]

- ক. $23 + 26 + 29 + \dots + 83$ ধারাটির পদসংখ্যা নির্ণয় কর। ২
খ. ধারাটি গুণোত্তর হলে, p ও q এর মান নির্ণয় করে ধারাটি নির্ণয় কর। 8
গ. ধারাটি সমান্তর হলে, এর প্রথম 12টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। 8

৭১ নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত ধারা: $23 + 26 + 29 + \dots + 83$

প্রথম পদ, $a = 23$

সাধারণ অন্তর, $d = 26 - 23 = 3$

ধরি, ধারাটির n -তম পদ $= 83$

∴ $a + (n-1)d = 83$

বা, $23 + (n-1) \cdot 3 = 83$

বা, $(n-1) \cdot 3 = 83 - 23$

বা, $n-1 = \frac{60}{3}$

বা, $n-1 = 20$

∴ $n = 21$

∴ ধারাটির পদসংখ্যা 21. (Ans.)

খ প্রদত্ত গুণোত্তর ধারা: $5 + p + q + 320 + \dots$

ধারাটির প্রথম পদ, $a = 5$

ধরি, সাধারণ অনুপাত $= r$

আমরা জানি,

গুণোত্তর ধারার n -তম পদ $= ar^{n-1}$

∴ 4 তম পদ $= ar^{4-1} = ar^3$

∴ $ar^3 = 320$

বা, $5 \cdot r^3 = 320$

বা, $r^3 = 64$

বা, $r^3 = 4^3$

∴ $r = 4$

∴ দ্বিতীয় পদ $= p = ar^{2-1} = 5 \times 4 = 20$

তৃতীয় পদ $= q = ar^{3-1} = 5 \times 4^2 = 80$

∴ ধারাটি: $5 + 20 + 80 + 320 + \dots$ (Ans.)

গ প্রদত্ত ধারা, $5 + p + q + 320 + \dots$

ধারাটি সমান্তর হওয়ায়, প্রথম পদ, $a = 5$

ধরি, সাধারণ অন্তর $= d$

আমরা জানি,

সমান্তর ধারার n তম পদ $= a + (n-1)d$

∴ 4 তম পদ $= a + (4-1)d$

বা, $320 = a + 3d$

বা, $320 = 5 + 3d$

বা, $3d = 315$

∴ $d = 105$

আমরা জানি,

সমান্তর ধারার n পদের সমষ্টি, $S_n = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\}$

$$\begin{aligned} \therefore 12\text{টি পদের সমষ্টি } S_{12} &= \frac{12}{2} \{2a + (12-1)d\} \\ &= 6\{2.5 + 11.105\} \\ &= 6\{10 + 1155\} \\ &= 6 \times 1165 \\ &= 6990 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

প্রশ্ন ৭২ (i) 1, 2, 3, 4, n ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা।

(ii) $a+1 + b-5 - \dots$ একটি সমান্তর ধারার n সংখ্যক সংখ্যার সমষ্টি - 95.
[বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল // প্রশ্ন নং ৩]

- ক. অনুক্রম কী? 2
- খ. (i) হতে দেখাও যে, n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি
 $= \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$ 8
- গ. (ii) হতে n এর মান নির্ণয় কর। 8

৭২ নং প্রশ্নের সমাধান

ক. অনুক্রম: যদি কতগুলো রাশি একটি বিশেষ নিয়মে ক্রমান্বয়ে এমনভাবে সাজানো হয় যে প্রত্যেক রাশি তার পূর্বের পদ ও পরের পদের সাথে সম্পর্কিত থাকে, তবে সেই সাজানো রাশিগুলোর সেটকে অনুক্রম বলে।

খ. পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনী ১৩.২ এর 'প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি নির্ণয়' অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা-২৫৮

গ. (ii) নং উদ্দীপক অনুসারে,

$a + 1 + b - 5 - \dots$ সমান্তর ধারাটির n সংখ্যক
সংখ্যার সমষ্টি - 95

সমান্তর ধারা বলে,

$$b - 1 = -5 - b$$

$$\text{বা, } 2b = -5 + 1$$

$$\therefore b = -2$$

$$\therefore \text{সাধারণ অন্তর, } d = b - 1 = -2 - 1 = -3$$

আবার, $d = 1 - a$

$$\text{বা, } -3 = 1 - a$$

$$\text{বা, } a = 4$$

$$\therefore \text{ধারাটি } 4 + 1 - 2 - 5 \dots$$

ধারাটির n সংখ্যক পদের সমষ্টি হবে

$$\frac{n}{2} \{2 \times 4 + (n-1) \times (-3)\}$$

$$= \frac{n}{2} (8 - 3n + 3)$$

$$= \frac{n}{2} (11 - 3n)$$

শর্তমতে,

$$\frac{n}{2} (11 - 3n) = -95$$

$$\text{বা } 11n - 3n^2 = -190$$

$$\text{বা, } 3n^2 - 11n - 190 = 0$$

$$\text{বা, } 3n^2 - 30n + 19n - 190 = 0$$

$$\text{বা, } 3n(n-10) + 19(n-10) = 0$$

$$\text{বা, } (n-10)(3n+19) = 0$$

n ঋণাত্মক হতে পারে না বলে, $3n+19 \neq 0$

$$\therefore n-10 = 0$$

$$\text{বা, } n = 10$$

$$\therefore n = 10 \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন ৭৩ একটি সমান্তর ধারার 12তম পদ 77 এবং 19 তম পদ 91।

সমন্বিত অধ্যায় ৫ ও ১৩

[বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বরিশাল // প্রশ্ন নং ৩]

ক. $\frac{x-2}{x-1} = 2 - \frac{1}{x-1}$ সমীকরণটির সমাধান সেট নির্ণয় কর। 2

খ. ধারাটি নির্ণয় করে 15তম পদ নির্ণয় কর। 8

গ. ধারাটির শেষ পদ 149 হলে, সমষ্টি নির্ণয় কর। 8

৭৩ নং প্রশ্নের সমাধান

ক. দেওয়া আছে, $\frac{x-2}{x-1} = 2 - \frac{1}{x-1}$

$$\text{বা, } \frac{x-2}{x-1} + \frac{1}{x-1} = 2$$

$$\text{বা, } \frac{x-2+1}{x-1} = 2$$

$$\text{বা, } \frac{x-1}{x-1} = 2$$

$$\text{বা, } 1 = 2$$

কিন্তু এটি সম্ভব নয়।

সুতরাং, প্রদত্ত সমীকরণের কোনো সমাধান নেই।

$$\therefore \text{নির্ণয় সমাধান সেট: } S = \emptyset$$

খ. মনে করি,

ধারাটির প্রথম পদ = a

সাধারণ অন্তর = d

$$\therefore 12\text{ তম পদ} = a + (12-1)d$$

$$= a + 11d$$

$$\text{এবং } 19\text{ তম পদ} = a + (19-1)d = a + 18d$$

শর্তমতে,

$$a + 11d = 77 \dots\dots\dots(i)$$

$$a + 18d = 91 \dots\dots\dots(ii)$$

(ii) হতে (i) বিয়োগ করে পাই,

$$a + 18d = 91$$

$$a + 11d = 77$$

$$\begin{array}{r} (-) \quad (-) \quad (-) \\ \hline 7d = 14 \end{array}$$

$$\therefore d = 2$$

d এর মান (i) নং এ বসিয়ে,

$$a + 11 \times 2 = 77$$

$$\text{বা, } a + 22 = 77$$

$$\therefore a = 55$$

$$\therefore \text{নির্ণয় সমান্তর ধারা: } a + (a+d) + (a+2d) + \dots$$

$$= 55 + (55+2) + (55+4) + \dots$$

$$= 55 + 57 + 59 + \dots \text{ (Ans.)}$$

$$15\text{তম পদ} = a + (15-1)d$$

$$= 55 + 14 \times 2 = 83 \text{ (Ans.)}$$

গ. 'খ' হতে পাই,

প্রথম পদ, $a = 55$

সাধারণ অন্তর, $d = 2$

ধরি, শেষ পদ = n তম পদ

$$\therefore n\text{ তম পদ} = 55 + (n-1)2$$

$$= 55 + 2n - 2 = 2n + 53$$

শর্তমতে $2n + 53 = 149$

$$\text{বা, } 2n = 96$$

$$\therefore n = 48$$

$$\therefore \text{ধারাটির পদ সংখ্যা, } n = 48$$

$$\therefore \text{ধারাটির সমষ্টি, } s = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\}$$

$$= \frac{48}{2} \{2 \times 55 + (48-1)2\}$$

$$= 24\{110 + 94\}$$

$$= 4896 \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন ৭৪ কোনো সমান্তর ধারার দুইটি নির্দিষ্ট পদ, l তম পদ l^2 এবং k তম পদ k^2 ।

[পিরোজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পিরোজপুর // প্রশ্ন নং ৩]

ক. ধারাটির প্রথম পদ a এবং সাধারণ অন্তর d হলে উদ্দীপকের আলোকে দুইটি সমীকরণ গঠন কর। 2

খ. ধারাটির $(l+k)$ তম পদ নির্ণয় কর। 8

গ. প্রমাণ কর যে, ধারাটির প্রথম $(l+k)$ সংখ্যক পদের সমষ্টি $\frac{l+k}{2}$

$(l^2 + k^2 + l + k)$

8

৭৪ নং প্রশ্নের সমাধান

ক আমরা জানি,

সমান্তর ধারার প্রথম পদ a এবং সাধারণ অন্তর d হলে,

l তম পদ $= a + (l - 1)d$

এবং k তম পদ $= a + (k - 1)d$

প্রশ্নমতে,

$a + (l - 1)d = l^2 \dots \dots (i)$

$a + (k - 1)d = k^2 \dots \dots (ii) \text{ (Ans.)}$

খ (i) নং থেকে (ii) বিয়োগ করে

$a + (l - 1)d - a - (k - 1)d = l^2 - k^2$

বা, $d(l - 1 - k + 1) = l^2 - k^2$

বা, $d(l - k) = (l + k)(l - k)$

$\therefore d = l + k$

\therefore ধারাটির $(l + k)$ তম পদ

$= a + (l + k - 1)d$

$= a + (l - 1)d + kd$

$= l^2 + k(l + k)$

$= l^2 + lk + k^2 \text{ (Ans.)}$

গ (i) নং এ d এর মান বসিয়ে পাই,

$a + (l - 1)(l + k) = l^2$

বা, $a + l^2 + lk - l - k = l^2$

$\therefore a = l + k - lk$

আমরা জানি,

সমান্তর ধারার প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি

$S = \frac{n}{2}(a + p)$

যেখানে p শেষপদ।

\therefore প্রদত্ত ধারাটির প্রথম $(l + k)$ সংখ্যক পদের সমষ্টি

$= \frac{l+k}{2} \{a + (l+k) \text{ তম পদ}\}$

$= \frac{l+k}{2} \{a + l^2 + lk + k^2\}$ [*খ' থেকে পাই]

$= \frac{l+k}{2} \{l + k - lk + l^2 + lk + k^2\}$ [মান বসিয়ে]

$= \frac{l+k}{2} (l^2 + k^2 + l + k) \text{ (প্রমাণিত)}$

প্রশ্ন ▶ ৭৫ (i) $\frac{a^3 + b^3}{a - b + c} = a(a + b)$

(ii) $7 + 12 + 17 + \dots$

◀ সমন্বিত অধ্যায় ১১ ও ১৩

[শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ, ঢাকা ৷ প্রশ্ন নং ৩]

ক (i) নং হতে দেখাও যে, a, b, c ক্রমিক সমানুপাতী। 2

খ 'ক' হতে প্রমাণ কর যে, $a - 2b + c = \frac{(a-b)^2}{a} = \frac{(b-c)^2}{c}$ 8

গ (ii) নং ধারার ১ম পদকে ১ম পদ এবং সাধারণ অন্তরকে সাধারণ অনুপাত ধরে একটি গুণোত্তর ধারা তৈরি করে ১ম ১০টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। 8

৭৫ নং প্রশ্নের সমাধান

ক পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনী-১১.১ এর উদাহরণ-৭ দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা-২১২

খ অধ্যায়-১১ এর সৃজনশীল ১১(গ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা-২৮১

গ (ii) নং ধারাটি $7 + 12 + 17 + \dots$

১ম পদ, $a = 7$

সাধারণ অন্তর, $d = 12 - 7 = 5$

সুতরাং, গুণোত্তর ধারার, ১ম পদ, $a = 7$

সাধারণ অনুপাত, $r = 5$

গুণোত্তর ধারার ১ম ১০টি পদের সমষ্টি,

$S_{10} = \frac{a(r^{10} - 1)}{r - 1}$

$= \frac{7(5^{10} - 1)}{5 - 1}$

$= \frac{7}{4}(5^{10} - 1)$

$= 17089842 \text{ (Ans.)}$

প্রশ্ন ▶ ৭৬ (i) $\frac{1}{\sqrt{5}} - 1 + \sqrt{5} \dots$ একটি গুণোত্তর ধারা।

(ii) একটি সমান্তর ধারার p তম পদ q এবং q তম পদ p ।

[বাড্ডা আলাতুল্লাহা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা ৷ প্রশ্ন নং ৩]

ক $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 99 =$ কত? 2

খ গুণোত্তর ধারাটির কোন পদ $625\sqrt{5}$? 8

গ সমান্তর ধারাটির $p + q - 1$ তম পদ কত? 8

৭৬ নং প্রশ্নের সমাধান

ক পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনী-১৩.১ এর উদাহরণ-৪ দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা-২৫৩

খ সৃজনশীল ২৪(খ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

গ সৃজনশীল ৪০(গ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ▶ ৭৭ $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots$ একটি গুণোত্তর ধারা।

[এ কে স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ৷ প্রশ্ন নং ৩]

ক ধারাটির সাধারণ অনুপাত কত? 2

খ ধারাটির ১ম সাতটি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। 8

গ প্রদত্ত ধারার ১ম পদকে ১ম পদ এবং সাধারণ অনুপাতের বিপরীত সংখ্যাকে সাধারণ অন্তর ধরে একটি নতুন ধারা তৈরি কর এবং প্রাপ্ত ধারাটির ৩০টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। 8

৭৭ নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত গুণোত্তর ধারা,

$1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots$

সাধারণ অনুপাত, $r = \frac{1}{3} \div 1 = \frac{1}{3} \text{ (Ans.)}$

খ সৃজনশীল ৪৬(গ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

গ প্রদত্ত ধারার প্রথম পদ, $a = 1$

সাধারণ অনুপাত, $r = \frac{1}{3}$

\therefore নির্ণেয় ধারার সাধারণ অন্তর, $d = \frac{1}{\frac{1}{3}} = 3$

\therefore নির্ণেয় ধারার প্রথম পদ, $a = 1$

দ্বিতীয় পদ $= a + d = 1 + 3 = 4$

তৃতীয় পদ $= a + 2d = 1 + 6 = 7$

চতুর্থ পদ $= a + 3d = 1 + 9 = 10$

\therefore নির্ণেয় সমান্তর ধারা: $1 + 4 + 7 + 10 + \dots \text{ (Ans.)}$

সমান্তর ধারার প্রথম n পদের সমষ্টি,

$S_n = \frac{n}{2} \{2a + (n - 1)d\}$

\therefore ধারাটির প্রথম ৩০টি পদের সমষ্টি,

$S_{30} = \frac{30}{2} \{2 \times 1 + (30 - 1)3\}$

$= 15 \{2 + 87\}$

$= 1335 \text{ (Ans.)}$

প্রশ্ন ▶ ৭৮ একটি সমান্তর ধারার প্রথম পদ ৩ এবং সাধারণ অন্তর ৪। আবার, একটি গুণোত্তর ধারার পঞ্চম পদ $3\sqrt{3}$ এবং অষ্টম পদ -27 ।

[এস এম মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ ৷ প্রশ্ন নং ৩]

ক $5 + b + 17$ সমান্তর ধারাভুক্ত হলে, b এর মান বের কর। 2

খ উদ্দীপকের সমান্তর ধারাটির n সংখ্যক পদের সমষ্টি ১৮৩০ হলে, n এর মান বের কর। 8

গ উদ্দীপকের গুণোত্তর ধারাটির ১২ তম পদ নির্ণয় কর। 8

৭৮ নং প্রশ্নের সমাধান

ক ধারাটি সমান্তর হওয়ায় সাধারণ অন্তর একই থাকবে।

\therefore সাধারণ অন্তর $= b - 5 = 17 - b$

বা, $b + b = 17 + 5$

বা, $2b = 22$

$$\text{বা, } b = \frac{22}{2}$$

$$\therefore b = 11 \text{ (Ans.)}$$

খ দেওয়া আছে,

সমান্তর ধারাটির প্রথম পদ, $a = 3$

সাধারণ অন্তর, $d = 4$

আমরা জানি,

সমান্তর ধারার n সংখ্যক পদের সমষ্টি,

$$S = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } 1830 = \frac{n}{2} \{2 \times 3 + (n-1)4\}$$

$$\text{বা, } n(6 + 4n - 4) = 3660$$

$$\text{বা, } 4n^2 + 2n - 3660 = 0$$

$$\text{বা, } 2n^2 + n - 1830 = 0$$

$$\text{বা, } 2n^2 + 61n - 60n - 1830 = 0$$

$$\text{বা, } n(2n + 61) - 30(2n + 61) = 0$$

$$\text{বা, } (2n + 61)(n - 30) = 0$$

$$\therefore n = 30, -\frac{61}{2}$$

যেহেতু পদের সংখ্যা ভগ্নাংশ বা ঋণাত্মক হতে পারে না।

$$\text{সুতরাং } n \neq -\frac{61}{2}$$

$$\therefore n = 30 \text{ (Ans.)}$$

গ সৃজনশীল ৬৩(খ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

অতঃপর, গুণোত্তর ধারাটির 12 তম পদ,

$$ar^{12-1} = ar^{11}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \times (-\sqrt{3})^{11}$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{3}} \times (\sqrt{3})^{11}$$

$$= -(\sqrt{3})^{10}$$

$$= -\{(\sqrt{3})^2\}^5$$

$$= -3^5$$

$$= -243 \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন ৭৯ $11 + 9 + 7 + 5 + 3 + \dots$ একটি সমান্তর ধারা।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর ৷ প্রশ্ন নং ২]

ক. ধারাটির 15 তম পদ নির্ণয় কর।

২

খ. ধারাটির প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি -253 হলে, n এর মান নির্ণয় কর।

৪

গ. ধারাটির 1ম পদকে 1ম পদ এবং সাধারণ অন্তরকে সাধারণ অনুপাত ধরে গঠিত

৪

গুণোত্তর ধারার 1ম দশটি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর।

৭৯ নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

প্রথম পদ, $a = 11$

সাধারণ অন্তর, $d = -2$

এখন,

$$n \text{ তম পদ} = a + (n-1)d$$

$$\therefore \text{ধারাটির 15 তম পদ} = 11 + (15-1) \times (-2)$$

$$= 11 + 14(-2)$$

$$= 11 - 28$$

$$= -17 \text{ (Ans.)}$$

খ আমরা জানি,

সমান্তর ধারার প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি,

$$S_n = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\}$$

$$\text{শর্তমতে, } \frac{n}{2} \{2 \cdot 11 + (n-1)(-2)\} = -253$$

$$\text{বা, } \frac{n}{2} \{22 - 2n + 2\} = -253$$

$$\text{বা, } \frac{n}{2} (24 - 2n) = -253$$

$$\text{বা, } n(12 - n) = -253$$

$$\text{বা, } 12n - n^2 + 253 = 0$$

$$\text{বা, } n^2 - 12n - 253 = 0$$

$$\text{বা, } n^2 - 23n + 11n - 253 = 0$$

$$\text{বা, } n(n-23) + 11(n-23) = 0$$

$$\text{বা, } (n-23)(n+11) = 0$$

$$\therefore n - 23 = 0 \text{ অথবা, } n + 11 = 0$$

$$\therefore n = 23$$

$$\therefore n = -11$$

$$\therefore n \text{ এর মান } 23।$$

$n = -11$ গ্রহণযোগ্য নয় কারণ পদসংখ্যা ঋণাত্মক হতে পারে না। (Ans.)

গ শর্তানুসারে,

গুণোত্তর ধারাটির প্রথম পদ, $a = 11$

সাধারণ অনুপাত, $r = -2 < 1$

\therefore গুণোত্তর ধারাটির প্রথম 10টি পদের সমষ্টি

$$= \frac{a(1-r^n)}{1-r}$$

$$= \frac{11\{1 - (-2)^{10}\}}{1 - (-2)}$$

$$= \frac{11\{1 - 1024\}}{1 + 2}$$

$$= \frac{11 \times (-1023)}{3}$$

$$= -3751 \text{ (Ans.)}$$

$$\text{প্রশ্ন } \triangleright \text{ } ৮০ \frac{1}{\sqrt{5}} - 1 + \sqrt{5} \dots$$

[কলেজিয়েট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, নীলফামারী ৷ প্রশ্ন নং ৩]

ক. ধারাটির 6 তম পদ কত?

২

খ. ধারাটির কোন পদ -625

৪

গ. ধারাটির n পদের সমষ্টি $\frac{-624}{5 + \sqrt{5}}$ হলে n এর মান নির্ণয় কর।

৪

৮০ নং প্রশ্নের সমাধান

ক ধারাটির প্রথম পদ, $a = \frac{1}{\sqrt{5}}$

সাধারণ অনুপাত, $r = \frac{-1}{\sqrt{5}} = -\sqrt{5}$

$$\therefore \text{ধারাটির } n \text{ তম পদ} = ar^{n-1}$$

$$\therefore \text{ধারাটির 6 তম পদ} = \frac{1}{\sqrt{5}} (-\sqrt{5})^{6-1}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} (-\sqrt{5})^5$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} (-25\sqrt{5})$$

$$= -25 \text{ (Ans.)}$$

খ মনে করি,

ধারাটির n তম পদ $= -625$

$$\text{বা, } ar^{n-1} = -625$$

$$\text{বা, } \frac{1}{\sqrt{5}} (-\sqrt{5})^{n-1} = -625$$

$$\text{বা, } (-\sqrt{5})^{n-1} = -625\sqrt{5}$$

$$\text{বা, } (-\sqrt{5})^{n-1} = (-\sqrt{5})^9$$

$$\text{বা, } n - 1 = 9$$

$$\text{বা, } n = 10$$

সুতরাং 10 তম পদ -625 (Ans.)

গ ধারাটির n পদের সমষ্টি $= \frac{-624}{5 + \sqrt{5}}$

বা, $\frac{a(1-r^n)}{1-r} = \frac{-624}{5+\sqrt{5}}$
 বা, $\frac{1}{\sqrt{5}} \{1 - (-\sqrt{5})^n\} = \frac{-624}{5+\sqrt{5}}$
 বা, $\frac{1 - (-\sqrt{5})^n}{\sqrt{5}(1+\sqrt{5})} = \frac{-624}{5+\sqrt{5}}$
 বা, $1 - (-\sqrt{5})^n = -624$
 বা, $-(-\sqrt{5})^n = -624 - 1$
 বা, $(-\sqrt{5})^n = 625$
 বা, $(-\sqrt{5})^n = (-\sqrt{5})^8$
 বা, $n = 8$ (Ans.)

প্রশ্ন ▶ চ-১ $\frac{1}{\sqrt{3}} - 1 + \sqrt{3} + \dots$ একটি গুণোত্তর ধারা এবং

$P = \frac{2^{m+1}}{(2^m)^{m-1}}; Q = \frac{4^{m+1}}{(2^{m+1})^{m-1}}$ সমন্বিত অধ্যায় ৪, ১১ ও ১৩

[কুমিল্লা হাই স্কুল, কুমিল্লা // প্রশ্ন নং ৩]

- ক. $a \div b = b \div c$ হলে, দেখাও যে, $\frac{a}{c} = \frac{a^2 + b^2}{b^2 + c^2}$ ২
 খ. ধারাটির কোন পদ $27\sqrt{3}$? ৪
 গ. প্রমাণ কর যে, $P \div Q = \frac{1}{4}$ ৪

চ-১ নং প্রশ্নের সমাধান

ক পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনী-১১.১ এর উদাহরণ-১১(ক) নং দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা-২১৪

খ ধারাটির প্রথম পদ, $a = \frac{1}{\sqrt{3}}$

সাধারণ অনুপাত, $r = \frac{-1}{\sqrt{3}} = -\sqrt{3}$

ধরি, ধারাটির n তম পদ $= 27\sqrt{3}$

$\therefore ar^{n-1} = 27\sqrt{3}$

বা, $\frac{1}{\sqrt{3}} (-\sqrt{3})^{n-1} = 27\sqrt{3}$

বা, $(-\sqrt{3})^{n-1} = 81$

বা, $(-\sqrt{3})^{n-1} = (-\sqrt{3})^8$

$\therefore n-1 = 8$

$\therefore n = 9$

\therefore ধারাটির ৯ তম পদ $27\sqrt{3}$ (Ans.)

গ দেওয়া আছে,

$P = \frac{2^{m+1}}{(2^m)^{m-1}}$ এবং

$Q = \frac{4^{m+1}}{(2^{m+1})^{m-1}}$

$\therefore P \div Q = \frac{2^{m+1}}{(2^m)^{m-1}} \div \frac{4^{m+1}}{(2^{m+1})^{m-1}}$

$= \frac{2^{m+1}}{2^{m^2-m}} \times \frac{2^{m^2-1}}{(2^2)^{m-1}}$

$= \frac{2^{m+1}}{2^{m^2-m}} \times \frac{2^{m^2-1}}{2^{2m+2}}$

$= 2^{m+1-m^2+m} \times 2^{m^2-1-2m-2}$

$= 2^{2m+1-m^2+m^2-3-2m}$

$= 2^{-2}$

$\therefore P \div Q = \frac{1}{4}$ (প্রমাণিত)

প্রশ্ন ▶ চ-২ একটি সমান্তর ধারার সপ্তম পদ ৩৪ এবং ১৫ তম পদ ৭৪ এবং অপর একটি

গুণোত্তর ধারার চতুর্থ পদ $\frac{2}{3\sqrt{2}}$ এবং দশম পদ $\frac{8\sqrt{2}}{84}$

[বুড়িচং আনন্দ পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা // প্রশ্ন নং ৩]

ক. $2^2 + 4^2 + 6^2 + \dots + 30^2 =$ কত? ২

খ. সমান্তর ধারাটি নির্ণয় কর। ৪

গ. গুণোত্তর ধারাটির সপ্তম পদ নির্ণয় কর।

৪

চ-২ নং প্রশ্নের সমাধান

ক $2^2 + 4^2 + 6^2 + \dots + 30^2$
 $= (2.1)^2 + (2.2)^2 + (2.3)^2 + \dots + (2.15)^2$
 $= 2^2 (1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 15^2) \dots \dots (i)$

আমরা জানি,

প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি,

$S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

$\therefore 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 15^2 = \frac{15(15+1)(2.15+1)}{6}$

$= \frac{15.16.31}{6}$

$= 1240$

\therefore নির্ণেয় সমষ্টি $= 2^2 \times 1240 = 4960$ (Ans.)

খ ধরি, সমান্তর ধারাটির প্রথম পদ a এবং সাধারণ অন্তর d

আমরা জানি, সমান্তর ধারার n তম পদ

$= a + (n-1)d$

\therefore সপ্তম পদ $= a + (7-1)d = a + 6d$

এবং ১৫ তম পদ $= a + (15-1)d = a + 14d$

প্রশ্নমতে,

$a + 14d = 74 \dots \dots (i)$

$a + 6d = 34 \dots \dots (ii)$

$(-)(-)(-)$

$8d = 40$

বা, $d = \frac{40}{8} = 5$

(i) নং সমীকরণে $d = 5$ বসিয়ে,

$a + 14.5 = 74$

বা, $a + 70 = 74$

$\therefore a = 4 =$ প্রথম পদ

\therefore সমান্তর ধারাটি নিরূপ:

$4 + 9 + 14 + 19 + 24 + 29 + 34 + \dots \dots$ (Ans.)

গ ধরি, গুণোত্তর ধারাটির প্রথম পদ a

এবং সাধারণ অনুপাত r

আমরা জানি,

গুণোত্তর ধারার n তম পদ $= ar^{n-1}$

\therefore ধারাটির চতুর্থ পদ $= ar^{4-1} = ar^3$

এবং দশম পদ $= ar^{10-1} = ar^9$

প্রশ্নমতে, $ar^9 = \frac{8\sqrt{2}}{84} \dots \dots (i)$

এবং $ar^3 = \frac{2}{3\sqrt{2}} \dots \dots (ii)$

(i) নং সমীকরণকে (ii) নং দ্বারা ভাগ করে,

$\frac{ar^9}{ar^3} = \frac{8\sqrt{2}}{84} \times \frac{3\sqrt{2}}{2}$

বা, $r^6 = \frac{2}{7} \dots \dots (iii)$

বা, $(r^6)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{2}{7}\right)^{\frac{1}{2}}$

$\therefore r^3 = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}}$

(ii) নং সমীকরণে r^3 এর মান বসিয়ে,

$a \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}} = \frac{2}{3\sqrt{2}}$

বা, $a = \frac{2}{3\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{2}}$

$= \frac{\sqrt{7}}{3}$

$$\begin{aligned} \therefore \text{গুণোত্তর ধারাটির সপ্তম পদ} &= ar^{7-1} \\ &= ar^6 \\ &= \frac{\sqrt{7}}{3} \times \frac{2}{7} \quad \text{[(iii) থেকে মান বসিয়ে]} \\ &= \frac{2}{3\sqrt{7}} \quad \text{(Ans.)} \end{aligned}$$

প্রশ্ন ▶ চ-৩ একটি সমান্তর ধারার 15 তম পদ 73 এবং 20 তম পদ 98। অপর একটি গুণোত্তর ধারা $\sqrt{2} + x + y + z + \frac{1}{2\sqrt{2}}$ ।

[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বান্দরবান // প্রশ্ন নং ৩]

- ক. সমান্তর ধারাটির ১ম পদ a ও সাধারণ অন্তর d ধরে দুইটি সমীকরণ গঠন কর। ২
- খ. সমান্তর ধারাটির 25 তম পদ নির্ণয় কর। ৪
- গ. x, y ও z এর মান নির্ণয় কর। ৪

চ-৩ নং প্রশ্নের সমাধান

ক মনেকরি,

$$\begin{aligned} \text{ধারাটির প্রথম পদ} &= a \\ \text{এবং সাধারণ অন্তর} &= d \end{aligned}$$

$$\therefore \text{ধারাটির 15 তম পদ, } a + (15 - 1)d = 73$$

$$\therefore a + 14d = 73 \quad \dots \dots \dots \text{(i)}$$

$$\text{এবং ধারাটির 20 তম পদ, } a + (20 - 1)d = 98$$

$$\therefore a + 19d = 98 \quad \dots \dots \dots \text{(ii)}$$

খ 'ক' হতে পাই,

$$a + 14d = 73 \quad \dots \dots \dots \text{(i)}$$

$$a + 19d = 98 \quad \dots \dots \dots \text{(ii)}$$

(ii) থেকে (i) বিয়োগ করে পাই,

$$19d - 14d = 98 - 73$$

$$\text{বা, } 5d = 25$$

$$\therefore d = 5$$

(i) নং থেকে,

$$a + 14 \times 5 = 73$$

$$\therefore a = 73 - 70 = 3$$

$$\therefore \text{ধারাটির 25 তম পদ} = a + (25 - 1)d$$

$$= 3 + 24 \times 5$$

$$= 123 \quad \text{(Ans.)}$$

গ দেওয়া আছে, গুণোত্তর ধারা, $\sqrt{2} + x + y + z + \frac{1}{2\sqrt{2}}$

ধরি, ধারাটির প্রথম পদ, $a = \sqrt{2}$

$$\text{সাধারণ অনুপাত, } r = \frac{x}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore \text{ধারাটির পঞ্চম পদ} = ar^{5-1}$$

$$\text{SSC গণিত মেইড ইজি উত্তরপত্র-১২ক}$$

$$= \sqrt{2} \left(\frac{x}{\sqrt{2}} \right)^4$$

$$= \frac{x^4}{2\sqrt{2}}$$

$$\therefore \frac{x^4}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$\text{বা, } x^4 = 1$$

$$\therefore x = 1$$

$$\therefore \text{সাধারণ অনুপাত, } r = \frac{x}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore \text{৩য় পদ, } y = ar^{3-1}$$

$$= \sqrt{2} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{৪র্থ পদ, } z = \sqrt{2} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^{4-1}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}$$

$$= \frac{1}{2}$$

$$\therefore x, y \text{ ও } z \text{ এর মান যথাক্রমে } 1, \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ ও } \frac{1}{2} \quad \text{(Ans.)}$$

প্রশ্ন ▶ চ-৪ (i) a, b, c ক্রমিক সমানুপাতী।

$$\text{(ii) } 3 + 6 + 9 + 12 + \dots \dots \dots$$

◀ সমন্বিত অধ্যায় ৪, ১১ ও ১৩

[কানাইঘাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট // প্রশ্ন নং ৩]

ক. $2^x + 2^{1-x} = 3$ হলে x এর মান নির্ণয় কর। ২

খ. (i) নং এর সাহায্যে দেখাও যে, $a^2b^2c^2 \left(\frac{1}{a^3} + \frac{1}{b^3} + \frac{1}{c^3} \right) = a^3 + b^3 + c^3$

গ. (ii) নং এ ধারাটির n সংখ্যক পদের সমষ্টি 630 হলে n এর মান নির্ণয় কর। ৪

চ-৪ নং প্রশ্নের সমাধান

ক $2^x + 2^{1-x} = 3$

$$\text{বা, } 2^x + \frac{2^1}{2^x} = 3$$

$$\text{বা, } a + \frac{2}{a} = 3 \quad [2^x = a \text{ ধরে}]$$

$$\text{বা, } \frac{a^2 + 2}{a} = 3$$

$$\text{বা, } a^2 + 2 = 3a$$

$$\text{বা, } a^2 - 3a + 2 = 0$$

$$\text{বা, } a^2 - 2a - a + 2 = 0$$

$$\text{বা, } a(a - 2) - 1(a - 2) = 0$$

$$\text{বা, } (a - 2)(a - 1) = 0$$

$$\text{হয়, } a - 2 = 0 \quad \text{অথবা, } a - 1 = 0$$

$$\text{বা, } a = 2 \quad \text{বা, } a = 1$$

$$\text{বা, } 2^x = 2^1 \quad \text{বা, } 2^x = 2^0 \quad [a \text{ এর মান বসিয়ে}]$$

$$\therefore x = 1 \quad \therefore x = 0;$$

$$\therefore x = 0, 1 \quad \text{(Ans.)}$$

খ অধ্যায়-১১ এর সৃজনশীল-১১(খ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা-২৮১

গ সৃজনশীল চ(খ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ▶ চ-৫ (i) $7 + p + q + s + 16807 + \dots$ একটি গুণোত্তর ধারা।

$$\text{(ii) } 7 + 12 + 17 + 22 + \dots \dots \dots$$

[ন্যাচারেল গ্যাস ফার্মিলাইজার ফ্যাক্টরি স্কুল, সিলেট // প্রশ্ন নং ৩]

ক. প্রথম 50টি স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয় করো। ২

খ. p, q, s এর মান নির্ণয় কর। ৪

গ. (ii) নং ধারাটির প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি 1090 হলে, n এর মান নির্ণয় কর। ৪

চ-৫ নং প্রশ্নের সমাধান

সৃজনশীল ৭নং সমাধান দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ▶ চ-৬ একটি সমান্তর ধারার 7 তম পদ 34 এবং 13 তম পদ 64 আবার একটি গুণোত্তর ধারার ৬ষ্ঠ পদ 96 এবং দশম পদ 1536।

[সরকারি এস সি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ // প্রশ্ন নং ৩]

ক. $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots + 12^2 =$ কত? ২

খ. সমান্তর ধারাটি নির্ণয় কর। ৪

গ. গুণোত্তর ধারাটির n সংখ্যক পদের সমষ্টি 3069 হলে n এর মান নির্ণয় কর। ৪

চ-৬ নং প্রশ্নের সমাধান

ক আমরা জানি,

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

সুতরাং, $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 12^2 = \frac{12(12+1)(24+1)}{6}$
 $= 650$ (Ans.)

খ আমরা জানি,

কোনো সমান্তর ধারার ১ম পদ a

সাধারণ অন্তর d হলে,

n তম পদ = $a + (n - 1)d$

∴ 7 তম পদ = $a + (7 - 1)d = 34$

বা, $a + 6d = 34 \dots \dots (i)$

এবং 13 তম পদ = $a + (13 - 1)d = 64$

বা, $a + 12d = 64 \dots \dots (ii)$

(ii) - (i) হতে পাই,

$6d = 30$

∴ $d = 5$

d এর মান (i) নং এ বসিয়ে পাই,

$a + 6 \times 5 = 34$

বা, $a = 34 - 30 = 4$

∴ ধারাটির ১ম পদ, $a = 4$

২য় পদ, $a + d = 4 + 5 = 9$

৩য় পদ, $a + 2d = 4 + 10 = 14$

৪র্থ পদ, $a + 3d = 4 + 15 = 19$

∴ ধারাটি, $4 + 9 + 14 + 19 + \dots$

গ ধরি, গুণোত্তর ধারাটির ১ম পদ a

সাধারণ অনুপাত r

সুতরাং, n তম পদ = ar^{n-1}

∴ ৬ষ্ঠ পদ, $ar^{6-1} = 96$

বা, $ar^5 = 96 \dots \dots (i)$

এবং ১০ম পদ, $ar^{10-1} = 1536$

বা, $ar^9 = 1536 \dots \dots (ii)$

এখন, (ii) ÷ (i) হতে পাই,

$\frac{ar^9}{ar^5} = \frac{1536}{96}$

বা, $r^4 = 16 = 2^4$

∴ $r = 2$

r এর মান (i) নং এ বসিয়ে পাই,

$a(2)^5 = 96$

বা, $32a = 96$

∴ $a = 3$

এখন, গুণোত্তর ধারাটির n সংখ্যক পদের সমষ্টি,

$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$

$= \frac{3(2^n - 1)}{2 - 1}$

$= 3(2^n - 1)$

শর্তমতে, $3(2^n - 1) = 3069$

বা, $2^n - 1 = 1023$

বা, $2^n = 1024 = 2^{10}$

∴ $n = 10$ (Ans.)

প্রশ্ন ৮৭ (i) $a^2 - \frac{2a}{x} + 1 = 0$

(ii) একটি সমান্তর ধারার প্রথম 12 পদের সমষ্টি 144 এবং প্রথম 20 পদের সমষ্টি 560.

◀ সমন্বিত অধ্যায় ১১ ও ১৩

[পিরোজপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, পিরোজপুর ৮৮ প্রশ্ন নং ৩]

ক. $128 + 64 + 32 + \dots$ ধারাটির নবম পদ নির্ণয় কর। ২

খ. (i) হতে দেখাও যে, $a = \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}$ । ৪

গ. (ii) হতে প্রথম 6 পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪

৮৭ নং প্রশ্নের সমাধান

ক ধারাটির প্রথম পদ, $a = 128$

সাধারণ অনুপাত, $r = \frac{64}{128} = \frac{32}{64} = \frac{1}{2}$

∴ n তম পদ = ar^{n-1}

∴ নবম পদ = $ar^{9-1} = 128 \times \left(\frac{1}{2}\right)^8$

$= 128 \times \frac{1}{256}$

$= \frac{1}{2}$ (Ans.)

খ দেওয়া আছে,

$a^2 - \frac{2a}{x} + 1 = 0$

বা, $a^2 + 1 = \frac{2a}{x}$

বা, $\frac{a^2 + 1}{2a} = \frac{1}{x}$

বা, $\frac{a^2 + 1 + 2a}{a^2 + 1 - 2a} = \frac{1+x}{1-x}$ [যোজন-বিয়োজন করে]

বা, $\frac{(a+1)^2}{(a-1)^2} = \frac{1+x}{1-x}$

বা, $\frac{a+1}{a-1} = \frac{\sqrt{1+x}}{\sqrt{1-x}}$ [বর্গমূল করে]

বা, $\frac{a+1+a-1}{a+1-a+1} = \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}$ [যোজন-বিয়োজন করে]

বা, $\frac{2a}{2} = \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}$

∴ $a = \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}$ (দেখানো হলো)

গ সৃজনশীল ৩৬(খ) নং সমাধান দ্রষ্টব্য।